

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น

เล็ก สูงไม่เกิน 30 ม. เมื่อมีอายุจะมีพุ่มพอง เปลือก สีน้ำตาลแดงถึงน้ำตาลเข้ม เรียบหรือลอก เปลือกในสีแดง มีกลิ่นคล้ายอัลมอนด์แรง (ไซยาไนด์) แตกเป็นร่องละเอียด ใบ กว้าง 3-7.5 ซม. ยาว 8-20 ซม. รูปไข่ถึงรูปไข่แกมขอบขนาน หรือพบน้อยรูป ใบหอก ปลายเรียวแหลม โคนกลมถึงค่อนข้างแหลม ขอบเรียบ ยอดอ่อนมีใบคล้ายเกล็ดเล็กๆที่โคน ใบแก่เนื้อคล้าย กระดาษถึงหนัง บาง เกลี้ยงทั้งสองด้าน มีจุดเล็กสีดำ ด้านล่าง เส้นใบเล็ก 8-12 เส้น เส้นใบย่อยห่าง ก้าน ใบยาว 0.5-1.2 ซม. มีต่อมเล็ก 2 ต่อม ใกล้ปลาย ก้านหรือตามขอบใบใกล้โคน หูใบกว้างได้ถึง 1.5 มม. ยาว 5 มม. รูปสามเหลี่ยมแคบ มีสันเชื่อมกันเป็นคู่ ร่วงเร็ว ดอก สีขาว ออกเป็นช่อเดี่ยวไม่แตกแขนง ยาว 2-6 ซม. (ถึง 10 ซม. ในผล) ส่วนมากออกไ้ร่อยแผล ใบ มีขนละเอียดสีน้ำตาลอมส้มหรือออกขาว (บนก้าน ใบและกลีบเลี้ยงด้วย) ก้านช่อดอกสั้น ก้านดอก 2-6 มม. หลอดกลีบเลี้ยงยาวประมาณ 2 มม. เกลี้ยงด้านใน กลีบเลี้ยง 5(6) กลีบ กว้าง 1-2 มม. ยาว 0.5-1 มม. ไม่ซัด รูปสามเหลี่ยม กลีบดอก 5(6) กลีบ ยาวกว่ากลีบเลี้ยงมาก รูปกลม ปลายกลม เกสรเพศผู้มี 25-50 อัน ยาว 4-7 มม. รังไข่เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียยาวได้ถึง 5 มม. ผล กว้าง 0.7-1.2 ซม. ยาว 1.5-2.3 ซม. คล้ายลูก กระสุน ปลายแหลม โคนกลม สีเขียวอ่อน สุกสีแดง มีกลิ่นไซยาไนด์แรงเมื่อตัดผล พบในป่าดิบที่ต่ำใกล้ ทะเล



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอนด์ ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : ธรรมวิมลบรรณพิมพ์ (ม.มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพดอก : http://www.phytoimages.siu.edu/users/pelserpb/9_28_14/28sep14/DSC_2319.jpg

ภาพใบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการมัธยมศึกษาแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี