

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น

หรือไม้ต้นเล็ก ไม่ผลัดใบ สูงได้ถึง 17 ม. มีก้านใหญ่ชูขึ้น ก้านเล็กห้อยลง เปลือก สีครีมถึงเทาอ่อน หรือน้ำตาล เรียบหรือมีรอยแตกละเอียด เปลือกในสีขาวถึงเหลืองอ่อน ใบ กว้าง 4-7 ซม. ยาว 10-18 ซม. พบน้อยกว้างได้ถึง 8 ซม. ยาวได้ถึง 25 ซม. รูปขอบขนานแกมรีถึงกิ่งรูปไข่กลับ ปลายแหลมถึงเรียวแหลมสั้น โคนรูปลิ้น ขอบเรียบ บางที่เป็นคลื่น ใบอ่อนสีเขียวอ่อน เกลี้ยง ใบแก่เนื้อคล้ายหนังบาง สีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านบน ด้านล่างสีอ่อนกว่า เกลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นกลางใบเป็นร่องด้านบน เส้นใบ 8-12 คู่ แบนแต่เห็นได้ ด้านบน นูนเล็กน้อยด้านล่าง เส้นใบย่อยจาง ก้านใบยาว 1.5-3 ซม. ค่อนข้างเล็กเรียว อาจเป็นปีกแคบใกล้ ปลาย เกลี้ยง แห้งสีออกดำ มีขนอ่อน กิ่งสีเทาอ่อนหรือออกขาว เกลี้ยง มีช่องอากาศเล็ก ดอก สีขาวถึงเหลืองอ่อน มักมีกลิ่นหอม สมบูรณ์เพศ ออกเป็นช่อเกลี้ยง แตกแขนงจำนวนมาก ยาว 6-12 ซม. ที่ง่ามใบหรือตาม กิ่งใต้รอยแผลใบ แขนงล่างๆยาวอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของแกนกลางช่อ ใบประดับยาว 0.3-1.5 ซม. คล้ายใบ ก้านดอกยาว 1-2 มม. กลีบเลี้ยงยาว 1-1.5 มม. จักจี้เป็นพู 4 พู เกลี้ยง กลีบดอกยาว 3-4 มม. จักจี้เป็น 4 พู รูปขอบขนาน ไม่ซ้อนทับกัน นุ่ม มักม้วนตามขอบ เกสรเพศผู้ติดที่หลอดกลีบดอกระหว่างพูกลีบ ก้านชูอับ เรณูสั้น อับเรณูรูปทรงไข่ ขนาดประมาณ 1 มม. รังไข่ขนาดประมาณ 1.5 มม. ทรงขวดแก้วก้นกลมคอยาว ก้านเกสรเพศเมียสั้นมาก ยอดเกสรเพศเมีย เป็น 2 พูไม่ขัด ผล กว้างประมาณ 1 ซม. ยาว 1.4-2 ซม. ก้าน ผลล่ำ ยาวได้ถึง 0.5 มม. ผลรีหรือกิ่งรูปไข่กลับ ปลายทุติงจะงอยแหลมสั้น โคนกลม มีกลีบเลี้ยงเล็ก ติดทน สุกสีแดงถึงสีดำ มีเนื้อบาง เมล็ดใหญ่แข็ง 1 เมล็ด พบเป็นแนวกว้างในป่าดิบที่ต่ำและที่สูงในภาคใต้ ส่วนมาก พบในที่ค่อนข้างโล่ง เช่น ตามชายป่า ยอดเขาหินปูนหรือตามชายฝั่งทะเล



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

