

ไม้ต้น สูงถึง 12 ม. ลำต้นสีน้ำตาลอออก เปลือก สีครีมถึงเทาอ่อน เรียบหรือขรุขระ มีช่องอากาศ หนูนเป็นคอร์ก ขนาดใหญ่ เปลือกในสีขาว ใบประกอบขนนกชั้นเดียว ยาว 30-90 ซม. ใบย่อยออกตรงข้าม 2-4(5) คู่ มีอีก 1 ใบที่ปลาย รูปไข่ถึงรูปขอบขนานแกมรี กว้าง 5-14 ซม. ยาว 10-30 ซม. ปลายแหลมหรือเรียวแหลม โคนเบี้ยว ขอบเรียบ ใบอ่อนสีม่วงเข้ม ใบแก่สีเขียวเป็นมันด้านบน ด้านล่างสีเขียวเกลี้ยง มีหย่อมของต่อมสีม่วง เข้มที่ ปลายทั้งสองด้านของเส้นกลางใบด้านล่าง ก้านใบย่อย ยาว 6-11 มม. ดอก ยาว 3-4 ซม. สีชมพูหรือม่วงอ่อน ก่อนข้างสมมาตรตามรัศมี บานตอนเช้า ออกเป็นช่อแคบยาว ยาว 12-50(90) ซม. ที่ปลายกิ่ง มักออกดอก และติดผลในเวลาเดียวกัน กลีบเลี้ยงรูปถ้วย ยาวประมาณ 3.5 มม. สีม่วง ปลายไม่เป็นพู มีต่อมรูปจันทร์เสี้ยว 5-8 ต่อม ที่ครึ่งล่างและติดอยู่จนเป็นแผล กลีบดอกเป็นรูปกรวยแคบหรือเกือบเป็นรูปท่อ มีพูสั้น 3-4 พู ไม่เท่ากัน มีขนละเอียดตามขอบ ด้านในเกลี้ยง เกสรเพศผู้ 4 อันเป็น 2 คู่ไม่เท่ากัน โคนมีขน ผล เป็นช่อ ห้อย รูปทรง กระบอกแคบ กว้างประมาณ 0.8 ซม. ยาว 20-30 ซม. ก่อนข้างตรง เมล็ดกว้างประมาณ 2 มม ยาว ประมาณ 13 มม. ที่ปลายทั้งสองด้านมีปีกบางคล้ายกระดาษ ผนังกันตรงกลางเป็นคอร์ก เป็นหลุมตื้น มี เมล็ดแบนติดอยู่

พบทั่วไปในป่าผลัดใบหรือป่าดิบที่ต่ำ โดยเฉพาะพบตามลำน้ำที่เปิดโล่ง



ข้อมูลอ้างอิง: ไฉยมงคล การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยาเขต ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1: กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2558. 768 หน้า  
ภาพประกอบ: ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มรดกอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี