

*Schizostachyum zollingeri* Steud.

พบเป็นไผ่ที่ขึ้นตามธรรมชาติในป่าดิบชื้นทางภาคใต้ของไทย รวมถึง กระจายทั่วไปในประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย เป็นไผ่ขนาดกลาง คล้ายไผ่ข้าวหลาม (*S. pergracile* เดิมใช้ *Cephalostachyum pergracile*) สูง 10-15 เมตร ลำตรงรวมกันเป็นกอแน่น ปลายลำโค้งลงเส้นผ่านศูนย์กลางลำ 2-10 เซนติเมตร ปล้องยาว 20-70 เซนติเมตร เนื้อลำบาง ลำแก่สีเขียวหรือเขียวอมเทา มีนวล สีขาวปกคลุมบางๆ เห็นได้ชัด บริเวณใต้ข้อ แตกกิ่งด้านบนของลำ แตกกิ่งขนาดเล็กหลายกิ่งไล่เลี่ยกัน ใบรูปหอกกว้าง 2-4 เซนติเมตร ยาว 15-30 เซนติเมตร กาบหุ้มลำสีน้ำตาลอมเหลืองถึงแดง มีขนสีน้ำตาลเข้มหรือดำปกคลุม ใบยอดกาบรูปหัวใจ หรือสามเหลี่ยมป่องออกที่ฐาน ปลายเป็นติ่งยาว แหลม หูกาบเป็นพู่เด่นชัด มีขนแข็งยาว การใช้ประโยชน์ ลำใช้ในงานก่อสร้าง เครื่องจักสาน ฝ้ายบ้าน หน่อกินได้ แต่ไม่นิยมเพราะมีรสขม



ข้อมูลอ้างอิง : <http://forprod.forest.go.th/forprod/techtransfer/document/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/2.%20%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B1%E0%B8%B4%E0%B8%B8%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/1.%20%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88/3.%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%B1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B9%88.pdf>

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรทางชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

