

ไม้ต้นขนาดเล็กถึงกลาง ไม่ผลัดใบ พุพอนสัน្ឩ เปลือกบาง มีช่องอากาศทั่วไป จะหนาขึ้นและเป็นเกล็ดตามอายุ เปลือกในสิน้ำตาล ในรูปร่องขอบนานแกรมรูปไข่ กว้าง 6 เซนติเมตร ยาว 13 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลมโคนทุ่งรูปสี่เหลี่ยม เนื้อคล้ายหนังบาง เกลี้ยงหรือมีขีบนเส้นใบด้านล่าง มีนาฬเส้นกลางใบบูนด้านล่าง เส้นใบเล็ก 10-14 คู่ ค่อนข้างตรง บูนด้านล่างขัด เส้นใบย่อยเล็กเป็นขั้นบันไดແນ່ນรูปดัว S ก้านใบยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ขนละเอียด ดอกสีขาวครีมถึงสีเหลืองอ่อน มีแต้มสีชมพูที่โคนด้านใน เป็นช่อยาวถึง 10 เซนติเมตร ที่ปลายยอดตามก้านใบหรือใต้แผ่นใบ ตடคอกรูปใบหอกกว้าง 2 มิลลิเมตร ยาวถึง 8 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงมีพูรูปไข่ ปลายพูพุใน 2 พูค่อนข้างแคบและบางกว่า มีขีบนสันด้านนอก เกลี้ยงด้านใน กลีบคอกรูปใบหอกแกรมขอบนานแคบ ค่อนข้างตรงมีขีบนสันด้านนอก เมื่อร่วงแยกกันเกรสรเพศผู้ประมาณ 25 อัน อับเรณูรูปขอบนานปลายมีรยางค์เป็นหนาม สันกว่าอับเรณู รังไข่รูปกรวยถึงรูปนาฬิกาทราย ขนแน่น ก้านเกรสรเพศเมียสันเกลี้ยง ผล มี 5 ปีกขนาดค่อนข้างเท่ากันกว้าง 1 เซนติเมตร ยาว 1-1.5 เซนติเมตร กลมและหนาเป็นวงล้อมโคนผล ตัวผลกลม ยาว 1.3 เซนติเมตร ปลายสัน มีขนละเอียด หายาก พบร่องตามริมฝีดแม่น้ำเฉพาะที่ จังหวัดยะลา



ข้อมูลอ้างอิง : ก้าวเดียว, ไรมอน ดินดา สิทธิอุมา ท่องเที่ยวภาคใต้ เชียงใหม่ปัตตานี เชียงใหม่ - ชุมชนท้องถิ่น 1-กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คู่มือ, 2558.หน้า
 kappaภาษาอังกฤษ : <http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Shorea+sumatrana>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

