

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น

ขนาดใหญ่ สูงถึง 35 ม. ไม้ผลัดใบ เปลือกหนา สีน้ำตาลอมเทาแตกเป็นร่องไม่เป็นระเบียบ เปลือกในมีเส้นใยเป็นชั้นสีเหลืองอ่อนและเหลืองเข้ม ใบ รูปขอบขนานแกมรี กว้าง 4-8 ซม. ยาว 7-18 ซม. ปลายและโคนห้หรือค่อนข้างแหลม ตามใบมีขนแข็งสีน้ำตาล ใบแก่หนาคล้ายหนัง สีเขียวเข้มและเกลี้ยงด้านบน ด้านล่างมีเกล็ดเล็กสีครีม (คล้ายเป็นนวล) ไม่มีตุ่มใบ เส้นกลางใบเป็นร่องด้านบน เส้นใบเล็ก 15-20 คู่ ตรง เส้นใบย่อยเล็กเป็นร่างแห ก้านใบใหญ่ยาว 2-4 ซม. หูใบรูปใบหอกแกมขอบขนาน ร่วงเร็ว ดอก สี เหลืองอ่อนมีแต้มสีชมพูที่โคนด้านใน ขนาด 2.5 ซม. เป็นช่อ ยาวถึง 20 ซม. ที่ปลายยอดและตามง่ามใบบนๆ าดดอก รูปไข่แคบ กว้างถึง 5 มม. ยาวถึง 10 มม. กลีบเลี้ยงมีพู่รูปใบหอก ค่อนข้างเท่ากัน กลีบดอกรูปขอบขนานแกมรูปไข่ เกสรเพศผู้ประมาณ 15 อัน อับเรณูรูปขอบขนานแคบ ปลายมีรยางค์เรียวเกลี้ยงยาว 2 เท่าของ อับเรณู รังไข่รูปไข่เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียเรียวแหลม ยาว 2 เท่าของรังไข่ ปลายแยกเป็น 3 ง่าม ผล ปีกยาว 3 ปีก กว้าง 2-3 ซม. ยาว 10-17 ซม. คล้าย สายเข็มขัดเกลี้ยง อีก 2 ปีกสั้นรูปขอบขนานแคบ กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 6-8 (12) ซม. ตัวผลรูปไข่กว้างถึง 2 ซม. ยาวถึง 3 ซม. ปลายเรียวแหลม ยาว 4 ซม. เกลี้ยง โคนปีกหุ้มผล มีด พบทั่วไปในดิบที่ต่ำ และป่าดิบที่มีไม้ผลัดใบ



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2558, 768 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

