

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 35 เมตร ลำต้น กลมตรง มีพูพอนสั้น เปลือก สีน้ำตาลอมเทา เรียบถึงแตกเป็นเกล็ดเล็กน้อยหรือแตกเป็นแผ่นตื้น มีช่องอากาศขัดจำนวนมาก เปลือกมีสีครีมอมเหลือง หรือมีจุดสีส้ม มียางสีขาว ใบกว้าง 4-12 ซม. ยาว 8-24 ซม. ออกสลับ เรียงเวียนบนกิ่ง รูปขอบขนานแกมรีถึงรูปไข่กลับ ปลายทู่หรือแหลมสั้น โคนทู่ถึงกลมหรือกึ่งรูปหัวใจ ขอบไม่จักหรือเป็นพู ใบแก่เนื้อคล้ายหนัง เกลี้ยงหรือมีขนละเอียด โดยเฉพาะบนเส้นใบหลักด้านบน ค่อนข้างมีขนแน่นโดยเฉพาะบนเส้นใบด้านล่าง เส้นใบหลักจากโคนใบ 1 เส้น จมเล็กน้อยด้านบน เส้นใบ 10-16 คู่ จมด้านบน เห็นชัดด้านล่าง เส้นใบย่อยคล้ายชั้นบันได เห็นชัดด้านล่างก้านใบยาว 2-3.5 ซม. มีขน หูใบยาว 0.5-1 ซม. เชื่อมติดกันเป็นคู่ มีขนละเอียดร่วงเร็ว ทั้งรอยแผลแฉกข้างก้านใบ (กิ่งรอบกิ่ง) กิ่งอ้วนลำ มีรอยแผลใบชัด มีขนสีน้ำตาลสนิมแน่นเมื่ออ่อน ช่อดอก กลมแน่น ดอกเพศผู้และดอกเพศเมีย อยู่ต่างต้น ออกเดี่ยวที่ซอกใบ หุ้มด้วยหนามแข็งหรือเกล็ด มีใบประดับ รูปสามเหลี่ยม 2-4 ใบ ยาว 0.5-1 ซม. อยู่ที่โคนของช่อกลม แต่ละดอกจมอยู่ในโพรงติดกันเป็นช่อกลมทั้งหมด กลีบรวมเชื่อมกันยกเว้นที่ปลาย เกสรเพศผู้หรือรังไข่โผล่พ้นดอกเล็กน้อยเมื่อแก่เต็มที่ ช่อดอกเพศผู้ขนาด 2.5-3.5 ซม. บนก้านยาว 2-3.5 ซม. มีหนามเล็กน้อย แต่ละดอก เกสรเพศผู้มี 2 อัน ยาว ได้ถึง 8 มม. ก้านชูอับเรณูแยกหรือโคนเชื่อมติดกัน อับเรณูยาวประมาณ 3 มม. ปลายสั้นชัด ช่อดอกดอกเพศเมียขนาด 2-3.5 ซม. บนก้านยาว 3-5 ซม. มีหนามชัด แต่ละดอกมีรังไข่ 1 อัน และยอดเกสรเพศเมียเล็กเรียวยาว 1-1.5 มม. ผล ขนาด 5-12 ซม. บนก้านอ้วนลำยาวได้ถึง 5 ซม. กิ่งทรงกลมหรือหนาใหญ่ เปลือกหนามีเปลือกกรูปรวย ยาวได้ถึง 1 ซม. (คล้ายทุเรียน แต่ไม่มีแหลมเท่า) สุกสีน้ำตาลทอง แก่แตกไม่สม่ำเสมอ ผลย่อยจำนวนมาก ล้อมรอบด้วยเนื้อแน่นรอบๆ แกนกลาง หายาก พบในป่าดิบที่ต่ำค่อนข้างสมบูรณ์ จ. สงขลา นราธิวาส ย่างมีพิช



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอนด์ ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mc-Z)-กรุงเทพฯ : อนุรักษ์พันธุ์พืชเมืองร้อนและสวนพฤกษศาสตร์, 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : <https://www.flickr.com/photos/adaduitokla/14380605208>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

