

ไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่ สูงได้ถึง 40 เมตร ไม้ผลัดใบ กิ่งเล็กเรียวโค้ง เมื่อแก่เรือนยอดคล้ายฉัตร ลำต้นมีร่องที่โคนหรือมีปุ่มไม่เป็นระเบียบ เปลือก สีน้ำตาลอมส้มถึงน้ำตาลเทา บางลอกเป็นแผ่นหรือเป็นเกล็ด เปลือกในสีชมพูอมแดง เส้นใยแน่น ใบ กว้าง 1-1.8 มิลลิเมตร ยาว 7-20 มิลลิเมตร ออกสลับ เรียงเวียน หรือออกดกที่ปลายกิ่ง รูปใบหอกแกมแถบแคบ ปลายเรียวแหลม โคนแคบ ใบแก่เนื้อคล้ายหนัง สีเขียวเข้มเป็นมันด้านบน ด้านล่างสีอ่อน เส้นกลางใบขนานชัดเจนทั้งสองด้าน เส้นใบอื่นๆจางมาก ก้านใบยาว 3-7 มิลลิเมตร ใบสันแต่ชัด ตาใบยาว 2-5 มิลลิเมตร ยาวกว่ากว้าง มีเกล็ดทาง โคนเพศผู้ยาว 2-5 มิลลิเมตร สีเหลืองอ่อน คล้ายหางกระรอก ออกเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม 2-3 โคนอยู่ด้วยกันที่ง่ามใบ แทงออกทุกทิศทาง ไม่มีก้านแต่ที่โคน มีเกล็ดสันหนารูปไข่ โคนเพศเมียยาวได้ถึงประมาณ 5 มิลลิเมตร ออกเดี่ยว มีฐานดอกเป็นถ้วยมีเนื้อหนาบนก้านยาว 5-10 มิลลิเมตร เมล็ด ขนาด 8-12 มิลลิเมตร สีดำอมม่วง มีผงสีขาวปกคลุมดูออกได้ง่าย ทรงรูปไข่เบี้ยว หรือรี โคนแคบ อยู่บนฐานดอกบวมสีม่วงอมแดงมีเนื้อนุ่ม ยาว 4-10 มิลลิเมตร ก้านเล็กเรียว ยาว 6-15 มิลลิเมตร

พบกระจายในป่าดิบที่ยังไม่ถูกทำลาย สูง 300-900 เมตร มักพบเป็นต้นแกรนมีใบเล็กกว่า อยู่ตามสันเขาที่ยอดจะเจริญได้ดีในที่ชื้นมีแสงจัด ต้นที่สูงตระหง่านนั้นหายาก



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน. ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

