

*Parartocarpus venenosa* Becc.

พญารากเหลือง

MORACEAE

ชื่ออื่น : หลีแคม พะยูน ลูกโยน ตาปอเยาะ

ไม้ต้น สูง 30-40 เมตร เรือนยอดค่อนข้างกลมถึงแผ่กว้าง เปลือกสีน้ำตาลเทา มีตุ่มขรุขระหรือล่อนเป็นแผ่นบาง เปลือกชั้นในสีส้ม แผ่นใบ รูปขอบขนาน รูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ ถึงรูปขนานแกมรูปหอก กว้าง 3.5-9 เซนติเมตร ยาว 10-17 เซนติเมตร ผิวใบเกลี้ยงเป็นมัน ปลายใบแหลม โคนใบสอบถึงมน เส้นแขนงใบ 9-12 คู่ ก้านใบยาว 3-5 เซนติเมตร ผล รูปไข่กว้าง เป็นพูโหนดนูนไม่สม่ำเสมอ กว้างยาว 10-18 เซนติเมตร มีตุ่มปลายแหลมสั้น ๆ ออกดอกระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม ผลแก่ประมาณเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม พบในป่าที่ลุ่มต่ำตามชายป่าพรุ และบางครั้งพบในป่าพรุทางภาคใต้ของประเทศไทย ในต่างประเทศพบที่มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เนื้อไม้ใช้ก่อสร้างภายในอาคารบ้านเรือน เมล็ดเมื่อต้มให้สุกรับประทานได้ ข้อควรระวัง เมล็ดดิบเป็นพิษมาก ถ้ารับประทานอาจทำให้ตายได้



ข้อมูลอ้างอิง : [http://www.dnp.go.th/Pattani\\_botany/พันธุ์ไม้ป่าพรุ/พญารากเหลือง/พญารากเหลือง.htm](http://www.dnp.go.th/Pattani_botany/พันธุ์ไม้ป่าพรุ/พญารากเหลือง/พญารากเหลือง.htm)

ภาพประกอบ : [http://phytoimages.siu.edu/imgs/psa/r/Moraceae\\_Parartocarpus\\_venenosa](http://phytoimages.siu.edu/imgs/psa/r/Moraceae_Parartocarpus_venenosa)



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

