

ชื่ออื่น :

ไม้ต้นขนาดกลาง สูงได้ถึง 25 (40) ม. โคนมีพูพอน สูงได้ถึง 1.2 ม. เปลือก สีน้ำตาลแดงถึงน้ำตาลเข้ม แตกเป็นแผ่นถึงค่อนข้างแตกเป็นแผ่นเล็ก เปลือกในสีชมพูถึงน้ำตาลแดง ใบ กว้าง 3-8 ซม. ยาว 8-21 ซม. ส่วนมากรูปใบหอกแกมรี ปลายเรียวแหลม โคนรูปปลีมนกว้าง ค่อนข้างเป็นรูปปลีมนเบี้ยว เนื้อบางคล้ายกระดาษถึงคล้ายหนังบางด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างมีขนสีสนิม แล้วค่อนข้างเกลี้ยง ยกเส้นบนเส้นใบ เส้นกลางใบเป็นร่องด้านบน เส้นใบ 10-17(22) คู่ เป็นวงและเชื่อมกันเป็นร่องด้านบน เส้นใบย่อยเป็นร่างแหห่างๆ จากทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 1-2.2(3) ซม. เล็กเรียว มีขนขุยสีสนิมถึงเกลี้ยง กิ่งเล็กเรียว กิ่งเล็กเรียว กิ่งอ่อนมีขนขุยสีสนิม แล้วเกลี้ยง ดอกสีขาว ออกเป็นกลุ่ม มี 2-8 ดอก ออกตามง่ามใบหรือใต้แผลใบ ก้านดอกยาว 8-22 มม. มีขนละเอียด กลีบเลี้ยงยาว 4.5-6 มม. มีขนละเอียดด้านนอก เกสรตัวผู้ด้านใน กลีบดอกยาว 7-9(11) มม. จักจี้มากกว่า 1/2 กลีบ เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 3 มม. ก้านชูอับเรณูมีขน รังไข่มีขน ก้านเกสรเพศเมียเกลี้ยง ยาว 9-15 มม. ผล รูปรีหรือค่อนข้างกลมกว้าง 1-2 ซม. ยาว 1.5-4 ซม. ปลายทู่หรือกลม มีขนละเอียดสีสนิม ผลแก่ค่อนข้างเกลี้ยง เมล็ด 1 เมล็ด พบกระจายในป่าดิบที่ต่ำ หรือชายป่าผลัดใบ สูงได้ถึง 500 ม. บางทีพบบนเขาหินปูน



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอนด์ ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z).-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพใบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนวิทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพผล : <https://www.inaturalist.org/taxa/427345-Payena-lucida>

