

พิกุลใบหนา

Palaquium sumatranum Burck

วงศ์ SAPOTACEAE

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น สูงได้ถึง 45 ม. เปลือกสีน้ำตาลออกสีสนิม ด้านในสีน้ำตาลซีด กิ่งอ่อนสั้น เส้นผ่าศูนย์กลาง 4-7 มม. มีขนสีน้ำตาลอ่อนประปรายถึงเกลี้ยง ตายาวได้ถึง 12 มม. มีขนเล็กน้อย ใบเลี้ยง รูปใบหอก กว้าง 1.5 มม. ยาว 5 มม. มีขนประปรายด้านนอก เกลี้ยงด้านใน ร่วงง่าย ใบ ชื้นถี่ทั้งกิ่ง คล้ายแผ่นหนัง เกลี้ยงทั้งสองด้าน รูปรีถึงขอบขนานแกมรูปไข่กลับ กว้าง 6-9.5 ซม. ยาว 13-19 ซม. ฐานใบรูปลิ้น ปลายใบมน เส้นกลางใบด้านบนเห็นได้ชัด ด้านล่างนูนชัด เส้นแขนงใบ 19-24 คู่ ชี้ขึ้นบน ทึบ 70-85 องศากับเส้นกลางใบ ค่อยๆ จางลงไปยังขอบใบ ด้านบนเรียบ นูนด้านล่าง เส้นแขนงใบย่อยสานกันเป็นร่างแห ก้านใบยาว 2.5-4 ซม. เป็นร่องและหนาขึ้นเล็กน้อยที่โคน มีขนสีแดงประปรายถึงเกือบเกลี้ยง ช่อดอกออกตามง่ามใบ เป็น กระจุก 1-3 ดอก ก้านดอกโค้ง ยาว 5-8 มม. มีขนสั้นหนานุ่มสีน้ำตาลปกคลุม กลีบเลี้ยงด้านนอกเป็นรูปไข่ กว้าง 2-5 มม. ยาว 5-6 มม. มีขนสั้นหนานุ่มสีน้ำตาลปกคลุมด้านนอก ด้านในเกลี้ยง กลีบเลี้ยงด้านในขอบ เป็นเยื่อบาง วงกลีบดอกเป็นแฉกรูปรีหรือรูปไข่ ยาวได้ถึง 8.5 มม. มีเกสร 12 อัน ก้านชูอับเรณูเป็นเส้นตรง ยาว 2-3 มม. เกลี้ยง เกสรเพศผู้ รูปขอบขนานหรือไข่กว่า ยาว 2-3 มม. เกลี้ยง อับเรณูมีรอยแตกหันออก รังไข่คล้ายรูปจาน ยาว 1-1.5 มม. มีขนสีน้ำตาลประปราย มี 6 ช่อง ก้านเกสรเพศเมีย รูปลิ้นแคบ ยาว 8-14 มม. ยอดเกสรเพศเมียเป็นแฉก 5 แฉก ผล คล้ายรูปไข่ถึงไข่กลับ ขนาดกว้าง 1.5 ซม. ยาว 2.5 ซม. มี 1 เมล็ด เปลือกหุ้มเมล็ดบางมาก เกลี้ยง เมล็ดเล็กกว่าผลเพียงเล็กน้อย ผิวเมล็ดไม่เรียบ เป็นรอยย่นประมาณ ¼ ของผิวเมล็ด พบกระจายในภาคใต้และมาเลเซีย



ข้อมูลอ้างอิง : แปลจาก : Tree flora of Sabah and Sarawak volume 4

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

