

ไม้ต้นขนาดกลาง สูงได้ถึง 25 เมตร ไม่มีพุ่มพอง เปลือก สีน้ำตาล แตกเป็นแผ่นเล็กน้อย เปลือกในสีเหลืองอ่อน ใบ กว้าง 4-7 เซนติเมตร ยาว 9-16 เซนติเมตร ส่วนมากออกเป็นกระจุกใกล้ปลายกิ่ง รูปไข่กลับกว้างถึงรี ปลายเรียวแหลมทู่ โคนรูปลิ้ม เบี้ยว เนื้อคล้ายหนังบาง ด้านบนค่อนข้างเป็นมัน มีขนสั้นไหมด้านล่าง เส้นใบ 8-12 คู่ เป็นวงและเชื่อมกันเป็นเส้นขอบใบ เส้นใบย่อยเป็นร่างแหหรือค่อยข้างขนานกับเส้นใบข้าง ก้านใบยาว 1.8-3.5 เซนติเมตร มีขนสั้นไหม กิ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.5 เซนติเมตร อ่อนมีขนขุยสีสนิม ดอก เป็นกลุ่มมี 4-8 ดอก ออกตามซอกใบ ก้านดอกยาว 6-9(18) มิลลิเมตร มีขนออกสีน้ำตาล กลีบเลี้ยงยาว 4-5 มิลลิเมตร มีขนแน่นด้านนอกและตรงกลางด้านใน กลีบดอกยาว 6-8 มิลลิเมตร แฉกรูปขอบขนาน ยาว 4-5 มิลลิเมตร เกสรทั้งสองด้าน (หรือมีขนเกาะสีสนิมระหว่างเกสรเพศผู้ด้านใน) เกสรเพศผู้มี 12 อัน อับเรณูและก้านชูอับเรณูมีขน รังไข่รูปจาน มีขนทั่วไป ก้านเกสรเพศเมียยาว 7-10 มิลลิเมตร เกสรทั้ง ผล (ไม่พบ) กว้างได้ถึง 1 เซนติเมตร ยาวได้ถึง 5 เซนติเมตร รูปรี ก้านผลใหญ่ล่ำ ยาวได้ถึง 3 เซนติเมตร เมล็ด 1 เมล็ด พบตามป่าที่ต่ำ สูงได้ถึงประมาณ 400 เมตร จังหวัด พังงา



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน. ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี