

ไม้ต้น สูงได้ถึง 25 ม. เส้นผ่าศูนย์กลางยาว 45 ซม. เปลือกเรียบถึงเป็นขุย สีสน้ำตาลอมเทา เปลือกด้านในสีน้ำตาลออกแดง กิ่งอ่อนสั้น เป็นเหลี่ยม มีขนนุ่มเหมือนกำมะหยี่สีน้ำตาลปนสนิมที่ปลายกิ่ง ตายอดยาว 5 มม. มีขนกำมะหยี่ปกคลุม ใบเลี้ยงมีขนาดเล็ก รูปใบหอก ร่วงง่าย ใบ คล้ายแผ่นหนัง เกลี้ยงทั้งสองด้าน รูปไข่กลับถึงไข่กลับแกมรี กว้าง 6.5-15 ซม. ยาว 13-32 ซม. ขอบเรียบ ฐานรูปลิ้มถึงลิ้มกว้าง ปลายมนหรือเรียวแหลม เส้นกลางใบและเส้นแขนงใบบนทั้งสองด้าน เส้นแขนงใบ 11-17 คู่ ทำมุมประมาณ 60 องศา กับเส้นกลางใบ ค่อยๆจางลงและเชื่อมกันที่ขอบใบ เส้นแขนงใบย่อยคล้ายตารางแกมชั้นบันได ช่องว่างเรียวยาว ชัดทั้งสองด้านแต่ด้านล่างชัดกว่า ก้านใบยาว 2-5 ซม. เกลี้ยง เป็นร่องกว้างตรงแกนกลาง โคนหนา ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบ ช่อละ 4-8 ดอก ก้านดอกเป็นเหลี่ยม ยาว 1.5 ซม. มีขน กลีบเลี้ยงรูปไข่ กว้าง 4-6 มม. ยาว 6-7 มม. ปลายมน กลีบดอกยาว 12 มม. รูปใบหอกแกมรี มี 10-12 กลีบ มีเกสรเพศผู้ 22-25 อัน ผลรูปไข่กลับแกมขอบขนาน กว้าง 1.2-1.5 ซม. ยาว 2-2.7 ซม. มี 1 เมล็ด ปลายผลป้านและ มีกะบังล้อมรอบ ก้านเกสรเพศเมียที่ติดทน ฐานรูปลิ้ม ผนังผลบางและเกลี้ยง เมล็ดรูปขอบขนาน กว้าง 0.8 ซม. ยาว 1.5 ซม. ปลายแหลมทั้งสองด้าน มีรอยแผลรูปแถบกว้างได้ถึง 5 มม. พบตามพื้นที่ต่ำในป่าเต็งรัง ความสูงไม่เกิน 50 ม.

ข้อมูลอ้างอิง : Soepadmo, E. Saw, L. G. and Chung, R. C. K. (2002). Tree flora of Sabah and Sarawak volume 4. Malaysia: Forest research institute Malaysia.



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

