

ชื่อพื้นเมือง

ต้นไม้อายุกลางถึงใหญ่ สูงได้ถึง 40 ม. โคนเป็นร่องหรือเป็นรูปขอบแฉก เปลือก สีน้ำตาลเข้ม แตกเป็นริ้วหรือเป็นแผ่นสากเป็นร่างแห เปลือกในสีชมพูหรือสีแดง มีเส้นใบ ใบ กว้าง 2-5 ซม. ยาว 8-14 ซม. รูปใบหอกถึงหอกแกมขอบขนาน ปลายเรียวแหลม โคนแหลมถึงกลม ค่อนข้างเบี้ยวเนือบาง ด้านบนเขียวเข้มเป็นมันและเกลี้ยง ด้านล่างมีขนละเอียดสีสนิม แล้วเกลี้ยง ยกเว้นบนเส้น ใบหลักไม่เป็นนวล เส้นกลางใบเล็กแบน หรือเป็นร่องด้านบน เส้นใบเล็ก 10-20 คู่ เส้นใบย่อยเป็นร่างแหละเอียด ก้านใบยาว 1-2.5 ซม. มีขนสั้นสีสนิม กิ่งเล็กเรียว กิ่งอ่อนมีขน ละเอียดสีสนิม ดอก สีขาวถึงครีม เหลืองอ่อน ออกเป็นกลุ่ม มี 3-10(14) ดอก ดอกออกตามง่ามใบหรือใต้แผลใบ ก้านดอกยาว 8-12(15) มม. กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 4 มม. มีขนสีสนิม โดยเฉพาะด้านนอก กลีบดอกยาว 6-9 มม. แฉกจักลึก 2/3 ของกลีบเลี้ยง เกสรหรือพบน้อยมีขน เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 3 มม. ก้านเกสรเพศเมียยาวได้ถึง 1.3 ซม. มีขนที่โคน ผล รูปไข่ 1.3-2.5 ซม. ยาว 3-4.5 ซม. มีขนละเอียดสีน้ำตาลอมส้ม เมล็ด 1 เมล็ด พบในป่าดิบที่ต่ำ สูงได้ถึง 400 ม. บางทีพบบนเขาหินปูน



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอนด์ ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

