


ไม้พุ่มหรือไม้ต้นเล็กสูงได้ถึง 8 เมตร ลำต้นสั้นกิ่งใหญ่ลำ เปลือก สีเทาอ่อนถึงน้ำตาลเข้มแก่แตกขรุขระ เปลือกในสีส้ม เป็นเม็ด ใบ กว้าง 3-5.5 เซนติเมตร ยาว 6-14 เซนติเมตร รูปรีถึงขอบขนานหรือรูปไข่ ปลายเรียวแหลมกว้าง โคนทู่หรือแคบ ขอบจักซี่ฟันละเอียดถึงค่อนข้างเรียบ ยอดอ่อนมีขนเส้นไหมสีน้ำตาลอมเหลืองแน่น ใบแก่เนื้อคล้ายหนัง สีเขียวเข้ม เกลี้ยงด้านบน ด้านล่างสีเขียวออกเทาอ่อนเส้นใบเข้ม มีขนคล้ายเส้นไหมบนเส้นใบมีจุดสีเข้มเล็กๆ จำนวนมาก เส้นใบ 10-12 คู่ข้าง ก้านใบยาว ประมาณ 0.6 เซนติเมตร ใหญ่ ลำ ชนละเอียด ดอก ยาว 1.2-1.6 เซนติเมตร สีขาว ออกเดี่ยวที่ง่ามใบ ก้านดอกใหญ่โค้ง ยาว 0.5-1.2 มิลลิเมตร มีใบประดับย่อยที่ปลาย 2 ใบ ออกตรงข้าม ขนาดไม่เท่ากันติดทนในผล ดาดอกมีขนเส้นไหมแน่น กลีบเลี้ยงยาว 7-10 มิลลิเมตร ขนาดไม่เท่ากัน รูปไข่กว้าง ปลายทู่หรือกลม เนื้อหนาขอบบางคล้ายกระดาษ มีขนเส้นไหม ด้านนอก บางที่ทางและแห้งคาค้น กลีบดอกยาว 8-10 มิลลิเมตร รูปสามเหลี่ยมแคบ ปลายแหลม มีขนละเอียด เส้นไหมตรงเส้นกลางด้านนอก นอกนั้นค่อนข้างเกลี้ยง ไม่ค่อยบาน ร่วงเร็ว เกสรเพศผู้ มีประมาณ 440 อัน ก้านชูอับเรณูเกลี้ยง อับเรณูมีขน รังไข่ (4)5 ช่อง มีขนเส้นไหมแน่น (รวมก้านเกสรเพศเมีย) ผล ยาว 1-1.8 เซนติเมตร กิ่งทรงกลม ปลายมีก้านเกสรเพศผู้ คล้ายเดือยยาว มีใบประดับย่อยและกลีบเลี้ยงติดทนที่ โคน มีขนละเอียดมี (4)5 ช่อง มีเนื้อเมล็ดเล็กหลายเมล็ด พบเฉพาะแห่งตามสันเขาหรือที่โล่งในป่าดิบเขา สูง 700-1,800 เมตร จังหวัดนครศรีธรรมราช บางที่พบที่อื่นด้วย ชนิดนี้มักจะสับสนกับ *A. phlebophylla* ชนิดที่เป็น *A. integrerrima* ใน Fl. Thai. นั้นจริง ๆ แล้วคือ *A. phlebophylla* ส่วน *A. oblonga* และ *A. Coaretata* นั้นน่าจะเป็น *A. integrerrima*



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z).-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรทางชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

