

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้นเรียวเล็ก ไม้ผลัดใบ สูงได้ถึง10ม. ลำต้นเดี่ยวเมื่อยังอ่อน ต่อไปแตกกิ่งตั้งตรงตามกิ่ง แต่ละกิ่งปลายมีใบออกเป็นกลุ่มเรียวยอดคล้ายร่ม เปลือก สีน้ำตาลเข้ม บาง แตกเป็นร่องตื้นตามแนวตั้งไม่สม่ำเสมอ ใบยาว50-100ซม. ใบประกอบขนนกปลายคี่ มีใบย่อย 20-30คู่ กว้างตรงข้าม ใบย่อยกว้าง 1.2-4ซม. ยาว5-15ซม. รูปขอบขนานแกมรีแคบปลายทู่หรือแหลม โคนกิ่งไม่เท่ากัน ขอบเรียบ มักเป็นคลื่น สีเขียวเข้มด้านบน ด้านล่างสีอ่อนกว่าและมรนวน กลี้ยงทั้งสองด้านหรือมีขนกระจายบนเส้นกลางใบ เส้นกลางใบบนทั้งสอง ด้านเส้นใบค่อนข้างตรงปลายบรรจบเป็นเส้นขอบใบอาจ ก้านใบและแกนกลางข้อสีน้ำตาลเข้มเป็นมันและแข็งคล้ายกิ่ง ใบย่อยไม่มีก้าน ติดกับแกนกลางโดยมีรอยบวมชัด กิ่งใหญ่ลำ เติบโตด้วยแผลใบใหญ่ ไม่มีหู ดอกขนาดประมาณ0.7ซม. สีม่วงมีขนสีเหลืองเหนียว ขนข้างมีกลิ่นเหม็นดอกแยกเพศผู้และดอกเพศเมีย อยู่บนต้นเดียวกัน ออกเป็นช่อแตกแขนงเรียวยาว 25-60ซม.ห้อยที่ง่ามใบ ก้านดอกและกลีบเลี้ยงมีขนแน่นสีเหลืองเหนียว กลีบเลี้ยงมีพูเล็กๆ 5พู ยาว 5-7ซม.(ยาว2-2.5เท่าของกว้าง) แยกกัน แต่แนบกันเป็นรูปประฆัง ปลายโค้งเข้า มีขนเหนียวทั้งสองด้าน ดอกเพศผู้มีเกสรเพศเมียสมบูรณ์5อันยาวประมาณ2มม. ติดตรงกับกลีบเลี้ยง สลับกับเกสรเป็นหมัน 5-10อัน มีขนสั้นกว่า ดอก เพศผู้เกสรเพศเมีย เป็นหมันเล็กมาก5อัน ยาวน้อยกว่า1มม.รังไข่แยก5อัน ขนละเอียดแน่น ก้านเกสรตัวผู้รวมกันก้านเดียว ยาวมากกว่า 1มม. มีเกสรตัวผู้ใหญ่เป็นพู5พู ผลขนาด1.2-1.8ซม. เป้มช่อยาวห้อยมีผลเป็นกลุ่ม1-5ผล สีเหลืองสุกสีดำแดง รีกว้างหรือขอบขนาน จงอยสั้นผ่องบาง มีเนื้อ เมล็ดแข็งแก่แตกหรือไม่แตก พบในป่าเดิมและป่ารุ่นในที่ต่ำ



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โชนอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

