

ไม้ต้น สูงได้ถึง 25 ม. โคนมีพุ่มเล็ก เปลือกสีครีมหม่นถึงน้ำตาลอมเทา หรือถึงน้ำตาลเข้ม แตกเป็นร่องละเอียด นุ่ม ใบ กว้าง 3-6 ซม. ยาว 6-12 ซม. รูปรี ปลายทู่หรือปลายแหลมสันโคน สอบแคบ ไป ยัง ก้านใบ สีเขียวเข้มเป็นมันด้านบน เนื้อหนาค่อนข้าง กึ่งเป็นร่อง 2 ร่อง หรือเป็นมุมเล็ก 4 มุมเมื่อยังอ่อน เมื่อ แก่กลม ดอก สีขาว ออกเป็นช่อแน่น มีหลายดอก ยาวประมาณ 1 ซม. บนปุ่มแข็งตามกิ่งแก่ ก้านช่อดอก สั้น (ยาวประมาณ 3 มม.) ก้านดอกยาว 3-4 มม. กลีบเลี้ยงยาว 2-3 มม. รูปประฆังขอบขนานหรือจักเป็นพูตื้น คอดเหนือรังไข่ กลีบดอกกว้างประมาณ 1.5 มม. ยาวประมาณ 3 มม. รูปไข่กว้าง ปลายแหลมเล็กน้อย หนา ขอบบางอับเรณูยาวประมาณ 1.5 มม. สีม่วงหรือสีฟ้า รูปตัวซี(C)มีต่อมตรงกลาง ผล ยาวประมาณ 1 ซม. บนก้านผลยาวได้ถึง 4 มม. รูปค่อนข้างกลม ขอบมีกลีบเลี้ยงคล้ายเป็นปล้องเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 มม. ผิวหนา สุกสีชมพูถึงสีแดงเข้ม มีเนื้อสีครีม หยาบสีกากีดำเมื่อแห้ง หายาก เป็นไม้ขึ้นรองในป่าดิบเดิม สูงประมาณ 500 ม. จ.สงขลา



ข้อมูลอ้างอิง: ไซมอน การ์ดเนอร์ พันดา สันติสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2559 792 หน้า
ภาพประกอบ: ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

