

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น

สูงถึง 20 ม. ใบรูปรีถึงใบหอกแกมขอบขนาน กว้าง 2-5 ซม. ยาว 4-14 ซม. ปลายเรียวแหลม โคนรูปสอบรูปลิ้ม มักเบี้ยว เกือบหรือมีขนประปรายบนเส้นกลางใบทั้งสองด้าน เส้นใบ 9-14 คู่ โค้งและเชื่อมกันเป็นวงจางๆ โกล้ขอบใบ เป็นร่องด้านบน เส้นใบย่อยเป็นร่างแหละเอียดเห็นไม่ชัด ก้านใบยาวประมาณ 0.5 ซม. มีขนแน่น ดอกเพศผู้ออกเป็นช่อกระจุกแน่นยาวถึง 0.5 ซม. ตามซอกใบ ก้านดอกสั้นมาก กลีบเลี้ยงยาว 2-3 ซม. รูปประซังกว้าง ปลายจักลึก 1/3 - 1/2 ของกลีบ เป็นแฉกรูปสามเหลี่ยม 4 แฉก ไม่ซ้อนกัน มีขนด้านนอก กลีบดอกยาว 4-6 มม. โคนเป็นรูปคนโท ปลายจักลึก 1/2 กลีบ เป็นแฉก 4 แฉก เกือบถึง เกสรเพศผู้ 14-18 อัน รังไข่เป็นหมัน เกือบถึง ดอกเพศเมีย ออกเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม 3 ดอก ก้านดอกยาว 1-2 มม. มีขน กลีบเลี้ยงกลีบดอกเหมือนในดอกเพศผู้แต่ใหญ่กว่า กลีบเลี้ยงจักลึก เกสรเพศผู้เป็นหมัน 4-10 อัน รังไข่เกือบถึง ผลขนาด 1.5-2 ซม. ก้านผลยาวถึง 1 ซม. กลมถึงรี ปลายสั้น โคนกลมเมื่ออ่อนมีขนกำมะหยี่แก่เกลี้ยง หรือมีขนที่ปลาย สีเขียวอมเหลืองสด สุกสีดำ ไม้ชุ่มน้ำ กลีบเลี้ยงเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 ซม. ไม้หุ้มโคนผล จักเป็นแฉกถึงโคน 4 แฉก ปลายโค้งกลับ ไม้จืดหรือเป็นคลื่น เกือบถึง พบในป่าดิบที่ต่ำบนเขาหินปูน

ข้อมูลอ้างอิง : ไลมอน การ์ดเนอร์ ฟินดา สิทธิสุนทร ก่องานตา ชยามฤต, ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.- กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : <https://florafaunaweb.nparks.gov.sg/special-pages/plant-detail.aspx?id=2811>

