

พลับพลา

Microcos tomentosa Sm.

วงศ์ MALVACEAE

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น

เล็ก ทรงพุ่ม สูงได้ถึง 15 ม. เรือนยอดกลมแน่นหรือทรงกระบอก ลำต้นมักเป็นร่องหรือบิดโค้ง เปลือกสีน้ำตาลอ่อนถึงน้ำตาลอมเทา แตกเล็กน้อย เปลือกในสีเหลืองอ่อน มีเส้นใยแน่น ใบ กว้าง 4-9 ซม. ยาว 8-20 ซม. รูปขอบขนานถึงรูปไข่กลับ ปลายแหลมสั้นหรือเรียวแหลม โคนกลม ค่อนข้างเท่ากัน ขอบจักซี่ฟันละเอียดอย่างน้อยที่ครึ่งบน ใบอ่อนสีน้ำตาลแดง ใบแก่สีเขียวมีขนกระจายบนเส้นใบด้านบน ด้านล่างเป็นรังแคและขนรูปดาว สีขาวหรือน้ำตาลอ่อน นุ่มมือ เส้นใบ 3 เส้นออกจากโคนใบคู่ข้างทำมุมสูงชัน ยาวขึ้นไปสองส่วนสามและสามส่วนสี่ของความยาวใบ เส้นใบข้าง 4-6 คู่ สูงชัน เส้นใบย่อยเป็นชั้นบันไดเห็นชัดด้านล่าง ก้านใบยาว 0.5-1 ซม. มีขน ดอก ยาวประมาณ 1.5 ซม. สีเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อตั้ง แตกแขนง กว้าง ยาว 3-15 ซม. ที่ปลายกิ่งและตามซอกใบบนๆ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ แยกกัน กว้าง 2 มม. ยาวประมาณ 8 มม. รูปใบหอกถึงรูปช้อน กางออก กลีบดอกกว้าง 0.5-1 ซม. ยาว 2-3 มม. สีเหลืองออกเขียว รูปสามเหลี่ยมตั้งชัน มีต่อมขนที่โคนด้านใน เกสรเพศผู้เกลี้ยง รังไข่มีขนแน่น ก้านเกสรเพศเมีย แตกกว้างเล็กๆ มียอดเกสรเพศเมียแคบแหลม ผล กว้าง 0.5-1 ซม. ยาว 1-1.5 ซม. กลมถึงรูปรี ปลายทั้งสองด้านทู่หรือกลม โคนไม่แคบเป็นก้าน ไม่เป็นพู สีเขียวสด สุกสีส้มถึงสีออกดำ มีขนกำมะหยี่สั้นแน่น หนา เหนียวด้านใน มีผนังผลชั้นในเป็นก้อนแข็ง 1 อัน พบทั่วไปในป่าผลัดใบชื้นและป่าดิบชื้น สูงได้ถึง 300 ม. ส่วนมากพบตามชายป่าหรือบริเวณค่อนข้างโล่ง



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปพ. 2559. 792 หน้า

ภาพประกอบ : ราชนิษฐ์ ภูมิก



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

