

ไม้ต้น

สูงถึง 20 ม. เปลือกสีน้ำตาลอมเทาเข้มแข็งเรียบหรือแตกเป็นแผ่นใหญ่บาง ใบ รูปขอบขนานถึงใบหอกแกมรี กว้าง 2.5-7 ซม. ยาว 10-22 ซม. ปลายเรียวแหลม โคนทู่หรือค่อนข้างแหลม กึ่งค่อนข้างเป็นเหลี่ยม สีน้ำตาลเข้ม มีช่องอากาศสีอ่อนทั่วไป เกลี้ยง ใบแก่คล้ายแผ่นหนังถึงหนังบาง เส้นใบโค้ง 7-10 คู่ ขนานกันกับระยะห่างเท่ากัน เป็นวงแล้วเชื่อมกันห่างจากขอบใบ ฐานล่าง เส้นใบย่อยเป็นชั้นบันได เห็นชัดทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 0.5-1 ซม. เป็นร่องด้านบน ขนเกลี้ยง ดอกเพศผู้เป็นช่อกระจุกแน่นตามซอกใบ ก้านดอกยาว 2-3 มม. มีขนละเอียดสีน้ำตาลอมเหลือง กลีบเลี้ยงยาว 4-5 ซม. รูปประจักษ์กว้าง ปลายจักครึ่งกลีบเป็นแฉกสามเหลี่ยม 4-5 แฉก มีขนสีน้ำตาลอมเหลืองด้านนอก ด้านในมีขนกระจายบนแฉกกลีบด้านใน กลีบดอกยาว 8-12 มม. สีขาว โคนเป็นรูปหลอดหรือคนโท ปลายจักลึก 1/3 ของกลีบเป็นแฉกรูปไข่กว้าง 5 แฉก ซ้อนกัน มีขนสีทองด้านนอก ด้านในมีเส้นไหมบนแฉก แต่ด้านในหลอดเกลี้ยงเกสรเพศผู้ 18-20 อัน อยู่เป็นคู่ เกลี้ยง รังไข่เป็นหมันมีขนสีทองแน่นหรือเกลี้ยง พบน้อยในป่าดิบที่ต่ำ สูงถึง 300 ม.



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ ฟินดา สิทิสุนทร กองกานดา ชยามฤต, ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.- กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

