

ปออีแก้ง


Pterocymbium tinctorium (Blanco) Merr.

วงศ์ MALVACEAE

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น

ใหญ่ ผลัดใบ สูงได้ถึง 30 ม. ลำต้นสูงตรงโคน มีพูพอนต่ำ มักออกดอกเมื่อใบร่วงหมด เปลือก สีเทาอ่อนถึงน้ำตาลอมเทา เรียบหรือมีปุ่มขนาดใหญ่ทั่วไป เปลือกในหนา นุ่ม สีชมพูหรือแดง มีขีดขาว มีน้ำเลี้ยงใส ใบ กว้าง 5-11 ซม. ยาว 7-16 ซม. เดี่ยว ออกเวียนสลับ รูปไข่ โคนรูปหัวใจ ขอบเรียบ เกือบทั้งสองด้าน เส้นใบ 5-7 เส้นออกจากโคนใบ คู่ข้างแตกแขนงมาก เส้นใบย่อยเป็นชั้นบันได ฐานด้านล่าง ก้านใบ ยาว 3-8 ซม. พองที่ปลายทั้งสองด้าน กิ่งใหญ่ล่ำ มีรอยแผลใบชัด ดอก ยาว 2-3 ซม. สีเขียวอ่อนแยกเพศ ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียร่วมต้น ออกเป็นช่อแตกแขนง ยาวได้ถึง 15 ซม. ที่ปลายกิ่งหรือใกล้ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงรูปประฆังถึงรูปกรวยกว้าง จักมากกว่าครึ่ง กลีบเป็นพูแหลม 5 พู กว้างได้ถึง 8 มม. ยาวได้ถึง 10 มม. เกือบยกเว้นมีขนตามขอบ ไม่มีกลีบดอก ดอกเพศผู้มีเกสรเพศผู้อยู่ 8-10 อัน อยู่เป็นกระจุกเป็นวงบนแท่งเล็กเรียว มีขนอย่างน้อยที่ครึ่งล่าง ดอกเพศเมียมีเกสรเพศเมีย 5 อัน แยกกัน ติดรวมเป็นกระจุกแน่นกับเกสรเพศผู้ เป็นหมันบนแท่งเล็กเรียว ก้านเกสรเพศเมียคล้ายตะขอ ผล กว้าง 3-4 ซม. ยาว 8-15 ซม. ออกเป็นกระจุก มี 4-6 ผล บนก้านช่อมีกลีบเลี้ยงติดทน ผล รูปเรือ มีพูเป็นกระโดงด้านเดียว เนื้อบาง คล้ายกระดาษ กิ่งโปร่งแสง มีเส้นชัด แตกกออกเป็นผลแก่มีเมล็ด 1-2 เมล็ด รูปรี ติดที่โคนผล พบทั่วไปในภาคใต้ ตามป่ากึ่งผลัดใบ ชายป่าดิบ ที่ต่ำ ผลโตเร็ว หลังการผสมเกสรขนาดโตเต็มที่ภายในไม่กี่วัน



ข้อมูลอ้างอิง : ไข่มอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองการดา ขยายฤดู ไม้ป่าภาคใต้-พิมพ์ครั้งที่ 1.- กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2559. 792 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพที่ 1. : <http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Pterocymbium+tinctorium>

ภาพที่ 2-4 : http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_dofplant&view=showone&id=1279



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

