

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้นสูงได้ถึง 15 เมตร (ถึง 45 เมตรในป่า) แต่กิ่งรอบต้นแนวราบเมื่ออ่อน เจริญเป็นเรือนยอดแน่น เมื่อแก่ เปลือก สีเทาอ่อนเรียบและเป็นเงาเมื่ออ่อน มีหนามรูปกรวย บนลำต้นและกิ่งใหญ่ๆ เปลือกในมียาง สีขาวเป็นพิษ ใบ เดี่ยวออกสลับ รูปไข่ถึงรี กว้าง 6-13 ซม. ยาว 7-21 ซม. ปลายเรียวแหลมโคนรูปหัวใจ ขอบจากซี่ฟันหรือเกือบเรียบ ยอดอ่อนมีขนละเอียดสีน้ำตาลอมเหลือง ใบแก่สีเขียวเข้ม เส้นใบสีอ่อน ด้านล่าง สีเขียวอ่อนกว่าเล็กน้อย เกือบทั้ง 2 ด้าน หรือมีขนกระจายบนเส้นกลางใบด้านล่าง ไม่มีต่อม เส้นใบลาออกจากโคนใบ 1 เส้น เส้นใบข้าง 11-16 คู่ โค้ง เส้นใบย่อยเป็นชั้นขนดละเอียด ชัดทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 6- 22 ซม. ยาวเกือบเท่าใบ เล็กเรียวปลายมีต่อม 1 คู่ ขนาด 1 มม ใบรูปใบหอกยาว 10-15 มม. ร่วงเร็ว ดอก แยกเพศ ดอกเพศเมียมีดอกเดี่ยว ดอกเพศผู้แน่นเป็นกลุ่มออกตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกเพศเมียเจริญก่อน ดอกเพศผู้ ไม่มีกลีบดอกหรือจานฐานดอก ดอกเบิ่ผู้ออกเป็นกลุ่มก้านช่อยาวคล้ายขี้ผึ้งขาวโพลเล็กน้อย มีดอก ประมาณ 100 ดอก มีกาบหุ้มหุ้มในตาดอก ก้านดอกยาวประมาณ 2 มม. กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย เกสรเพศผู้เชื่อมเป็นหลอดสีแดงสด อับเรณูสีขาว 10-20 อัน เรียง 2-3 วง ไม่มีรังไข่เป็นหมัน ดอกเพศเมียออก เดี่ยว บนก้านดอกใหญ่สีเขียวสด ยาวประมาณ 1.2 ซม. กลีบเลี้ยงยาว 5-8 มม. เป็นหลอดสั้นขอบเรียบ ก้าน เกสรเพศเมียเชื่อมเป็นหลอดสีแดงเข้ม ยาว 2-3.5 ซม. ปลายแผ่ออกคล้ายร่มเป็นจานฐานดอกซึ่งคล้ายเป็น ยอดเกสรเพศเมีย ผล ขนาด 5-8 ซม. สีเขียวอ่อนสุกสีน้ำตาลแดง กลมแบน มีร่องหลายร่อง ปลาย 2 ด้านบุ่ม เปลือกหนา จะค่อยๆแข็งขึ้น แยกเป็นครึ่ง 5-20 อัน แต่ละครึ่งมีเมล็ดเรียบสีน้ำตาล 1 เมล็ด เมื่อสุกจะแตก ฝักร่วงออกมา พืชพื้นเมืองของอเมริกาเขตร้อน มักปลูกในวัดหรือสองข้างทางในภาคใต้ ใบคล้ายกับใบโพธิ์มาก แต่มีหนามตามลำต้น ทำให้แยกออกจากกันได้ชัดเจน



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองงานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้เล่ม2 – พิมพ์ครั้งที่ 1-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปพ. 2559. 792 หน้า

ภาพประกอบ : <http://tropical.theferns.info/image.php?id=Hura+crepitans>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

