

ชื่อพื้นเมือง :



ไม้ต้น ไม้ผลัดใบ ไม้อาศัยไม้อื่น สูงได้ถึง 25 ม. เรือนยอดแน่น ลำต้นกลม โคนมีพูพอนเมื่ออายุมากขึ้น เปลือก สีน้ำตาลครีมหรือเทาเปราะบาง ยางสีขาวคล้ายน้ำ ใบ กว้าง 3-7 ซม. ยาว 8-22 ซม. ออกสลับ เรียงเวียนหรือกึ่งระนาบเดี่ยว แผ่นบนบึง รูปขอบขนานแกมรีถึงรูปไข่กว้างแคบ ปลายเรียวแหลม ยาว 1-1.5 ซม. โคนห้หรือรูปลิ้ม กลมถึงรูปหัวใจลึก ไม่เบี้ยว ขอบไม่จัก ส่วนยอดอ่อนสีออกขาว ใบแก่เนื้อบางแต่แข็ง สีเขียวเข้มเป็นมันด้านบน สีอ่อนกว่าและเกลี้ยงหรือมีขนสั้นกระจายโดยเฉพาะบนเส้นกลางใบด้านล่าง เส้นกลางใบค่อนข้างแบนด้านบน เส้นใบจากโคนใบมักเห็นไม่ชัด มีต่อมไขที่เส้นซอกใบ เส้นใบข้าง 8-15 คู่ โค้งและไปเชื่อมใกล้ขอบใบ เส้นใบย่อยคล้ายร่างแหถึงเป็นขั้นบันไดจาง เส้นบางแต่นูนชัดด้านล่าง ก้านใบยาว 1-2 ซม. เป็นเกล็ด หูใบยาว 0.5-1.5 ซม. มีขนละเอียด ร่วงเร็ว ผล ขนาด 0.8-1.4 ซม. ออกเดี่ยวหรือเป็นคู่ ที่ง่าม ใบหรือใต้แผลใบเล็กน้อย สีเหลืองออกเขียวแก่สีส้มหรือน้ำตาลแดง เกลี้ยง ทรงกลมหรือลูกแพร์ โคนแคบเป็นคอเรียว ยาว 0.6-1.5 ซม. ไม่มีก้านผลที่แท้จริง ใบประดับ 3 ใบ ยาว 1-2 มม. ติดทนที่โคนของคอกผล (ใกล้กึ่ง) พบกระจายในป่าดิบเดิมที่ต่ำและป่าดิบเขาสูงได้ถึงประมาณ 800 ม.

ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z).-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพใบ/ผล : <http://www.herbarium.gov.hk/subpages.aspx?id=3056>

ภาพลำต้น : <http://tropical.theferns.info/image.php?id=Ficus+nervosa>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

