

ไม้ต้น ผลัดใบช่วงสั้น สูงได้ถึง 20 ม. ลำต้นตรงแตกกิ่งเป็นวงรอบตามแนวราบ โคนมี พูพอนสั้น เปลือกสีน้ำตาลอมส้มถึงสีน้ำตาลเข้ม แตกเป็นชั้นเล็กๆ หรือเป็นเกล็ด เปลือกใน สีน้ำตาลอมชมพูเรื่อ ใบ กว้าง 6-13 ซม. ยาว 12-24 ซม. ใบเดี่ยว ออกสลับเวียน แต่มักออกตกลำไปทางปลายกิ่ง รูปไข่ ถึงรีแกมขอบขนาน หรือถึงรูปไข่กลับ ปลายแหลมสั้นหรือปลายแหลมกว้าง โคนรูปหัวใจตื้น พบน้อย ที่โคนกลมหรือแบน ยอดอ่อนมีขนสีส้มอ่อนแน่น ใบแก่เป็นสีเขียวสดเป็นมัน และเกลี้ยงโดยเฉพาบนเส้นใบ ด้านบน ด้านล่างสีอ่อนกว่ามีขนนูนหนาแน่น เส้นใบ 3 เส้นข้าง เส้นข้างประมาณ $\frac{1}{4}$ ของความยาวใบ เส้นใบข้าง 8-12 คู่ ตรง แล้วไปโค้ง โกลข้อ ขอบ ก้านใบยาว 3-7 ซม. เล็กเรียว พองเล็กน้อย แต่ไม่โค้งที่ปลาย มีขนสีน้ำตาลอมส้มแน่น กิ่งมีขนสีน้ำตาลอมแดงแน่นเมื่ออ่อน มีรอยแผลใบชัด ดอก ยาวประมาณ 0.5 ซม. สีชมพูออกดอกแดง หรือสีส้ม มีสีแดงเส้นตรงกลาง ออกเป็นช่อแตก แขนงย่อยห้อย ยาว 8-30 ซม. โกลปลายกิ่งหรือได้ก้าน ใบอ่อน ก้านดอกยาว 3-4 ซม. ขนแน่น มีใบประดับ แหวมแคบ กลีบเลี้ยงรูปประจักษ์ถึงกรวยต่ำ ปลายจักร 5 แฉก รูปสามเหลี่ยม กางออกหรือโค้งเล็กน้อย แฉกยาวน้อยกว่า $\frac{1}{2}$ ของหลอดกลีบ ขนแน่นทั้งสองด้าน ดอกเพศผู้ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.5 ซม. กลีบเลี้ยงยาว 3-5 มม. เกสรเพศผู้สมบูรณ์ 8-12 อัน ดอกเพศเมียใหญ่กว่าดอกเพศผู้ เล็กน้อย กลีบเลี้ยง ยาว 4-8 มม. เกสรเพศเมียและก้านเกสรเพศเมีย มีขน ยอดเกสรเพศเมียจัก 3-5 พู ผล กว้าง 2-5 ซม. ยาว 5-12 ซม. ออกเป็นกลุ่ม แผ่ๆ มี 2-3(5) ผลที่ปลายก้านช่อที่ห้อยลง รูปไข่ กลับแกมขอบขนาน หรือคล้ายลูกแพร์ หนามัน มีขนสีน้ำตาลอมเหลือง เมล็ดมี 4-10 เมล็ดสีน้ำตาล กว้างประมาณ 5 มม. ยาวประมาณ 12 มม. พบทั่วไปในป่าเดิมสะปารุ่น ที่ต่ำ บางทีบนหินปูน ต้นกล้ามีใบใหญ่กว่ากว้างๆได้ถึง 20 ซม. ยาวได้ถึง 37 ซม. ก้านใบยาวกว่า ยาวได้ถึง 18 ซม.



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ ดินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต, ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.- กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2559. 792 หน้า.

ภาพประกอบ : www.flickr.com by Cerlin Ng