

ปอดำ

Melochia umbellata (Houtt.) Stapf

วงศ์ MALVACEAE

ชื่อพื้นเมือง : เปอ,ฝ้ายผีใหญ่,สาดำ

ไม้ต้น

เล็ก ทรงพุ่ม สูงได้ถึง 5 ม. เรือนยอดกลมแน่น ลำต้นสั้น เปลือก สีออกเทาอ่อน มีรอยแผลใบติดทน เปลือกใบหนา สีส้มชมพู ใบ กว้าง 8-22 ซม. ยาว 10-24 ซม. เดี่ยว ออกเวียนสลับ รูปไข่กว้างถึงรูปหัวใจ ปลายทู่หรือค่อนข้างเรียวแหลม ขอบจักหยาบ ยอดอ่อนมีขนเส้นไหมสีเงิน ใบแก่สีเขียว มีขนนุ่มแน่นอย่างน้อยด้านล่าง เส้นใบ 3-5 เส้นออกจากโคนใบ คู่ข้างแตกแขนงมาก เส้นใบ 4-6 คู่ ยาวไปถึงขอบใบเส้นใบย่อยเป็นชั้นบันได ก้านยาว 7-18 ซม. เล็กเรียว มีขนละเอียด หูใบยาว 0.6-2 ซม. กลม คล้ายใบ เห็นชัดในยอดอ่อน ร่วงง่าย ดอก ยาว 0.8-1.3 ซม. สีชมพูอ่อน สมบูรณ์เพศ ออกเป็นช่อแตกแขนงตั้ง ทรงพริ้ว ยาว 10-30 ซม. ตามซอกใบและปลายกิ่ง งามมีใบประดับที่เป็นหนาม ก้านช่อดอกยาว 2-15 ซม. มีขนนุ่มแน่น ก้านดอกยาว 3-4 มม. กลีบเลี้ยงจักรครึ่งกลีบ เป็นพูแคบแหลม 5 พู มีขนทั้งสองด้าน กลีบเลี้ยง 5 กลีบแยก กว้าง 1 มม. ยาว 5-6 มม. รูปขอบขนานถึงรูปช้อน โคนแคบ ร่วงเร็วหลังจากผสมเกสร เกสรเพศผู้มี 5 อัน โคนเชื่อมขึ้นมาครึ่งหนึ่ง และเชื่อมติดกลับกลีบดอก ก้านชูอับเรณู 5 อันสีขาว อับเรณูสีเหลืองสด รังไข่ 5 ช่อง รูปไข่ เป็นพวยาว 5 พู ไม่มีก้าน ก้านเกสรเพศเมียแยก 5 อัน ยอดเกสรเพศเมียแคบแหลม ผล ยาว 0.8-1.5 ซม. รูปไข่ มีร่องตามยาว 5 ร่อง ปลายมีก้านเกสรเพศเมียอยู่ 5 อัน ติดแน่นแห้ง บางแข็งเมื่อแก่ แก่แตกออกเป็น 5 เสี่ยง แต่ละเสี่ยงมี 1 เมล็ด รูปสามเหลี่ยม มีปีก พบทั่วไปในป่ารุ่นทั่วไปในภาคใต้



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2559. 792 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพใบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพดอก/ผล : [http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Melochia0umbellata0\(Houtt.\)0Stapf](http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Melochia0umbellata0(Houtt.)0Stapf)



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

