

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น

เล็กผลัดใบ สูงได้ถึง 12(20) ม. เรือนยอดเปิดแตกกิ่งกระจาย ส่วนมากใบร่วงหมดเมื่อออกดอก เปลือก สีเทาเงินถึงน้ำตาลอมส้ม เรียบหรือแตกกรุ่นริ้วบ้าง ใบกว้าง 3.5-5 ซม. ยาว 8-13 ซม. ใบเดี่ยวออก สลับเวียน รูปไข่กลับถึงขอบขนานแกมรูปไข่ ปลายกลมถึงแหลมกว้าง โคนกลมถึงรูปหัวใจตื้นมาก สองข้างเท่า กัน เนื้อบางเกลี้ยงด้านบน มีขนกระจายถึงค่อนข้างเกลี้ยงด้านล่าง เส้นใบ 3 เส้นออกจากโคนใบ คู่ขนานยาว ประมาณ 1/4 ของใบ เส้นใบข้าง 5-7 คู่ เส้นใบย่อยเป็นชั้นบันไดไม่เป็นระเบียบ ก้านใบยาว 1-4 ซม. ป่องที่ ปลายทั้งสองด้าน มีขนกระจาย กิ่งมีขนละเอียดเมื่ออ่อน มีตายอดใหญ่ ดอก สีชมพูถึงสีส้มออกแดงด้านนอก ด้านในสีแดงเข้ม ออกเป็นช่อตั้งหรือช่อแตกแขนงกระจาย ยาว 5-9 ซม. กลีบปลายกิ่ง (แต่ก็มีตาดอกอยู่ตรง กลาง) มักมีหลายดอกอยู่รวมเป็นกลุ่ม ก้านดอกยาว 3-18 มม. เล็กเรียว มีข้อต่อ กลีบเลี้ยงยาว 7-10 มม. รูปประฆัง ปลายจัก 1/2 ออกเป็นแฉกแคบ 5 แฉกโค้งเข้าและปลายแตะกันโค้งมากตามขอบ แก่สุดจะค่อนข้างบานออกมีขนชัดเจน และบนหลอดกลีบทั้งสองด้าน ดอกเพศผู้ยาวประมาณ 0.8 ซม. เกสรเพศผู้มี 6-10 อัน เป็นก้านกลมบนเส้นเกสรเรียวเล็ก ตั้งตรงเกลี้ยง ยาว 1.5- 3 มม. ดอกเพศเมียยาวประมาณ 1 ซม. มีเกสรเพศเมียอยู่(4) 5 อัน มีขน อยู่บนเส้นเกสรอวบเกลี้ยง ยาว 0.5 มม. ก้านเกสรเพศเมียมี 1 อัน เกลี้ยง หรือมีขนกระจายทั่วไป ยอดเกสรเพศเมียจับ (4)5 พูโค้ง ผล (ไม่พบในไทย) กว้างประมาณ 1.5 ซม. ยาว 3.5-6.5 ซม. มี 3-5 ผลบนก้านช่อ โค้งปลายมีงอย สีแดงสด หนามัน มีขนแน่นด้านนอกด้านในเกลี้ยง มี 1-4 เมล็ด กว้างประมาณ 0.8 ซม. ยาวประมาณ 2 ซม. รูปรี พบในป่าผลัดใบเปิด บนยอดเขาหินปูน ตั้งแต่ระดับน้ำทะเลถึง 300 เมตร จังหวัด กระบี่ สตูล สงขลา เป็นพืชพบใหม่ในไทย รูปร่างใบหลายแบบ ไม่เป็นรูป ไข่กลับ อย่างเดียวเหมือนในหนังสือ flora ในมาเลเซีย



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ ฟินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม่ป่าภาคใต้เล่ม2 - พิมพ์ครั้งที่ 1-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปฟ. 2559. 792 หน้า
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

