

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น ผลัดใบช่วงสั้นๆ คุนยไ้ได้ถึง 30 ม. เรือนยอดเป็นกรวยแคบหรือทรงกระบอก แต่กิ่งแนวราบ ปลายห้อย ลำต้นมีพู่พอนและเป็นร่องหรือบิตที่โคน เปลือก สีน้ำตาลอ่อนหรือน้ำตาลอมเทา แตกเป็นสะเก็ด เล็ก เปลือกในสีชมพูหรือออกน้ำตาล มียางขาว ใบ กว้าง(2) 4-7 ซม. ยาว (5)12- 22 ซม ออกเวียนสลับรูป ขอบขนานแกมรีแคบ ถึงรูปใบหอกกลับ ปลายเรียวแหลม โคนแคบขอบเรียบ ใบอ่อนสีแดงสด ออกเต็มต้น อยู่ไม่กี่วัน ใบแก่ห้อยลง แผ่นใบคล้ายหนังบางเกลี้ยงทั้งสองด้าน ใบแก่สีออกเหลือง เส้นใบข้าง 7-12(17) คู่ ท้ำมุม 90 องศากับเส้นกลางใบ เป็นวงเชื่อมกันใกล้ขอใบ เส้นใบย่อยเป็นร่างแห หนูนชัดโดยเฉพาะด้านล่าง ก้านใบยาว 2.5 - 7 ซม . ปลายบวมมีต่อมเล็ก 1 คู่ หูใบยาว 2-3 มม. รูปสามเหลี่ยม ดอก สีขาวถึงเหลืองอ่อน มีกลิ่นสาบแรง สมมาตร แยกเพศ ออกเป็นช่อเล็กแตกแขนงเป็นง่าม มีกลุ่มดอกเพศผู้ล้อมรอบดอกเพศเมีย เตี้ยๆ ที่ปลาย ช่อดอกกว้างได้ถึง 8 ซม. ยาวได้ถึง 19 ซม. ก้านช่อดอกยาว 2-9 ซม. ออกแน่นที่ปลายกิ่งและ ออกพร้อมๆกันกับใบอ่อน ดอกเพศผู้ขนาด 2-3 มม. ก้านดอกยาว 2 - 7 มม. กลีบเลี้ยงแยกซ้อนกัน 4-6 กลีบ เรียงเป็น 2 วง ไม่มีกลีบดอก เกสรเพศผู้มี 10-20 อัน ยาวประมาณ 3 มม. โคนของก้านชูอับเรณูล้อม รอบด้วยจานฐานดอกเป็นพู ดอกเพศเมียขนาดประมาณ 5 มม.ก้านดอกยาว 2-5 มม. กลีบเลี้ยงเหมือนใน ดอกเพศผู้แต่มีขนาดยาว 5-8 มม. ไม่มีกลีบดอก รังไข่ขนาด 2.5 ถึง 4 มม.ขุนแน่น ล้อมรอบด้วยจานฐานดอก รูปถ้วย มีเกสรเพศผู้เป็นหมันเล็กๆหลายอัน ก้านเกสรเพศเมียสั้น 3 อัน ยอดเกสรเพศเมียแตกด้านหนา ขนาด ประมาณ 0.5 มม. ผล ยาว 4-6 ซม. ห้อยอยู่บนก้านยาวเรียวยาวรูปขอบขนานเป็น 3 ร่อง เกลี้ยง สุกสีชมพูถึง น้ำตาลเข้ม แตกระหว่างพูออกเป็น 3 เสี่ยง สองครั้ง เมล็ดเป็นเหลี่ยม 3 เมล็ด พบทั่วไปในป่าดิบ ป่ากึ่งผลัดใบ มักพบบนเขาหินปูน จ. นครศรีธรรมราช พัทลุง ยะลา นราธิวาส



ข้อมูลอ้างอิง : โสมอน การ์ดเนอร์ วัฒนา สิทธิสุนทร ก้องกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้เล่ม2 - พิมพ์ครั้งที่ 1-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2559. 792 หน้า  
 ภาพประกอบ : ภาพผล : <https://florafaunaweb.nparks.gov.sg/special-pages/plant-detail.aspx?id=2875>  
 ภาพใบ/ดอก : ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

