

ไม้ต้นสูงถึง 40 ม. กิ่งผลัดใบ ลำต้นสูงเรียว พูพอนสูงชัน สูงถึง 2 ม. เปลือกสีเทาอ่อนถึงสีน้ำตาลแดง เรียบหรือแตกเป็นร่องตื้น หรือเป็นเกล็ด เปลือกในสีชมพูอมส้ม เป็นเม็ด มีน้ำเลี้ยงสีครีมเป็นหยด ไม่มีพิษ ใบเดี่ยว เวียนสลับหรือเป็นกระจกรอบข้อ รูปรีแคบถึงรูปใบหอกแกม ขอบขนาน กว้าง 2-4.5 ซม. ยาว 7-17 ซม. ปลายแหลมทั้งสองด้าน หรือโคนหู่ ขอบเป็นคลื่น ใบแก่คล้ายหนังบาง สีเขียวเข้มเป็นมันด้านบน ด้านล่างมักมีนวล เกลี้ยง เส้นกลางใบนูนกลมด้านล่าง เส้นใบ 14-25 คู่ เส้นใบย่อยเป็นร่างแห ก้านใบเล็กเรียว ยาว 2-6 มม. โคนบวม ด้านบนแบน หรือเป็นร่อง กิ่งเล็ก เกลี้ยง ดอก สีขาวถึงเขียวอ่อนหรือเหลือง สมบูรณ์เพศหรือดอกเพศผู้ เป็นช่อเล็ก แตกแขนงยาว 10-25 ซม. ที่ปลายกิ่งหรือช่อใบบน มีขนแก่ เกลี้ยง ก้าน ดอกเล็กเรียว ยาว 3-8 มม. ดอกเป็นกลุ่มต่างๆ บนแกนกลาง กลีบเลี้ยงรูปถ้วยจักเป็นแฉก ¼-1/6 ของกลีบ 5 แฉก ยาว 0.5 มม. กลีบดอก 5 กลีบรูปขอบขนานแคบ กว้าง 2 มม. ยาว 5 มม. ซ้อนกัน ไม่มีสันหรือเป็นสีเหลือง ด้านใน เกลี้ยงหรือมีขนสั้น เกสรเพศผู้ และรังไข่แยกกันโดยมีก้านขัด ยาวประมาณ 2 มม. เกสรเพศผู้ 5 อัน เท่ากัน ยาวถึง 4 มม. ก้านชูอับเรณูเล็กเรียว อับเรณูรูปขอบขนาน สมบูรณ์ทุกอัน ติดสลับกับพูคล้ายต่อมของ จานฐานดอกนูน รังไข่เหนือวงกลีบ รูปไข่เบี้ยว ยาวประมาณ 1 มม. (ลดรูปหรือไม่มีในดอกเกสรเพศผู้) มี 1 ช่อง มีขน ก้านเกสรเพศเมีย 21 อัน ยาว 3-4 มม. ผล มีกลีบดอกคล้ายกลีบปีก 5 ปีก กางหรือโค้งกลับ กว้าง 0.8-1.2 ซม. ยาว 4-6 ซม. รูปขอบขนานแคบ สีเขียวอ่อนถึงสีชมพูอมส้ม แล้วเปลี่ยนเป็นสีแดง ตัวผลกลม ยาว 1-1.6 ซม. แยกออกจากปีก ก้านสั้น มี 1 เมล็ด พบในป่าดิบ เขาหินปูน



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ ฟินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต, ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.- กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2559. 792 หน้า.

ภาพประกอบ : <http://crassa.cocolog-nifty.com/blog/2014/07/swintonia-flori.html>