

พริกเหลือง

Orophea cuneiformis King

วงศ์ ANNONACEAE

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้พุ่ม

หรือไม้ต้น สูง 13 ม. เปลือกสีน้ำตาลอมเทาถึงน้ำตาลเข้ม เรียบหรือหยาบเล็กน้อย มีช่องอากาศเล็กจำนวนมาก เปลือกในสีครีมถึงเหลืองหรือส้ม มีเส้นสีน้ำตาลสานกัน ใบ รูปขอบขนาน กว้าง 3-5 ซม. ยาว 6-9 ซม. ปลายแหลมหรือเรียวแหลม โคนกลม ใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีขนสีสนิมหรือสีอมขาวแน่น ใบแก่เนื้อคล้ายหนัง ด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างมีขนอย่างน้อยบนเส้นใบ เส้นใบ 8-10 คู่ห่างกัน ก้านใบยาวประมาณ 3 มม. มีขน กิ่งอ่อนมีขนหนาแน่นต่อไปเป็นสีน้ำตาลเข้ม เกือบถึง ดอก ยาวประมาณ 0.6 ซม. สีชมพู ปลายมีสีเขียวเมื่ออ่อน เปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อนหรือสีครีมเมื่อแก่ ออกเดี่ยวหรือเป็นช่อมี 2-4 ดอก ก้านช่อดอกยาวถึง 7 ซม. ก้านดอกยาวถึง 5 มม. ขนแน่นทั้งสองด้านออกที่ซอกใบหรือเหนือซอกใบเล็กน้อย าดดอกกลม กลีบเลี้ยงรูปไข่ยาวประมาณ 2.5 มม. ปลายแหลม มีขนแน่นด้านนอก กลีบดอกวงนอกรูปไข่ ยาวประมาณ 4 มม. ปลายแหลม มีเส้น 5 เส้น เนื้อบางคล้ายกระดาษ ด้านนอกมีขนแน่น ด้านในมีขน กระจายถึงโคนข้างเกลี้ยง วงในยาว 7-10 มม. รูปสามเหลี่ยมเพชร ปลายหู่ โคนมีก้านเล็ก ยาวเท่ากับตัว กลีบแนบกันและเชื่อมกันตามขอบบน เมื่ออ่อนแยกกันเล็กน้อย แต่ไม่บานออกเมื่อแก่ ด้านในไปยังโคนมี ต่อมน้ำหวานตามแนวราบ 2 ต่อม เกสรเพศผู้สมบูรณ์ 6 อันเรียง 1 วง ติดสลับกับเกสรเพศผู้เป็นหมัน ที่คล้ายต่อม 3 หรือ 6 อัน เกสรเพศเมียแน่น 6 อัน รูปขอบขนาน มี 2-3 อวูล ผล ทรงกระบอก กว้าง 0.5-1 ซม. ยาว 3-5 ซม. ปลายแหลม ไม่มีก้านผล มี 4-6 ผล สีเขียวอ่อน สุกสีแดง ขนสีขาว มี (1)2 เมล็ด รูปขอบขนาน พบทั่วไปในป่าดิบหรือป่ากึ่งผลัดใบ



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ เล่มที่ 1.

- พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

