

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูง 8 ม. เปลือก เรียบบาง สีน้ำตาลเข้ม เปลือกในสีส้มถึงสีน้ำตาลอ่อน ค่อนข้างมีเส้นใย ใบ รูปขอบขนานหรือพบบ้างเป็นรูปไข่แคบ กว้าง 3.5-7 ซม. ยาว 9-18 ซม. ปลายเรียวแหลม โคนรูปลิ้ม เนื้อ คล้ายแผ่นหนังบาง ด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างสีเขียวอ่อน เกือบหรือมีขนกระจายบนเส้นกลางใบ เส้นกลาง ใบเป็นร่องด้านบนเล็กน้อย เส้นใบ 5-7 คู่ มีเส้นสั้นแซมระหว่างกลางโค้งและเชื่อมติดกันห่างจากขอบ 5-8 มม. งามหรือขนด้านบน ขุนด้านล่าง ก้านใบยาว 3-7 ซม. เกือบหรือมีขน กิ่งอ่อนเล็ก มีขนกระจายถึงหนาแน่น เมื่อแก่เกลี้ยง ดอก ยาวประมาณ 0.6 ซม. สีครีมมีสีชมพูแต้ม หรือสีแดงขุ่นปลายสีครีม ออกเดี่ยวหรือ 2-3 ดอก ตามซอกใบหรือตามกิ่งใต้ใบ ก้านช่อดอกยาว 1-4 มม. ก้านดอกยาว 3-5 มม. กลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยม แกมรูปไข่ ยาวประมาณ 2 มม. กลีบดอกวงนอกรูปไข่ถึงค่อนข้างกลมยาวประมาณ 3.5 มม. มีขนกระจายถึง แน่นด้านนอก วงในยาว 5-7 มม. รูปเหลี่ยมเพชร ปลายแคบแหลม แนบกันเมื่ออ่อนแต่ไม่เชื่อมกัน ต่อไปจะ ค่อยๆ แยกออก มีปลายกางออก มีเนื้อเกลี้ยง หรือมีขนทั้งสองด้าน ด้านในมีต่อมน้ำหวาน รูป U คว่ำ หรือตัว H เกสรเพศผู้สมบูรณ์ (6)12 อันเรียง (1)2 วง ไม่มีเกสรเพศผู้เป็นหมัน เกสรเพศเมีย 12 อัน ยาวประมาณ 1 มม. มีขนเล็กน้อย ผลกลมยาวประมาณ 1 ซม. สีเขียวมีจุดสีม่วงอมแดง เกือบทั้งก้านผลยาวประมาณ 0.3 ซม. มีถึง 12 ผล ก้านช่อผลยาว 1 ซม. มี 1-2 เมล็ด พบทั่วไปเป็นไม้ชั้นรองในป่าดิบที่ต่ำ จ.ระนอง พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี



ข้อมูลการค้นคว้า, ไข่มอน พินตา สิทธิสุนทร กองงานคช ขยายเขต ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม – พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปฟ. 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มรดกทางชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มรดกทางชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

