

ชื่อพื้นเมือง :



ไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 13 ม. กิ่งตัน (ไม่มีมีดอยู่อาศัยอยู่) เปลือก สีเทาอ่อนถึงน้ำตาลเข้ม เรียบ หรือแตกเล็กน้อย เปลือกในสีส้มอ่อนถึงสีน้ำตาลแดง ใน กว้าง 3-7 ซม. ยาว 8-18 ซม. ออกดอกใกล้ปลายกิ่ง ไม่จัดเป็นพุ รูปรีหรือขอขาน ปลายแผลมหรือเรียวแผลมสั้น ค่อยๆ แคบไปยังโคนกลมหรือกึ่งรูปหัวใจ ก้านไม่ ปิดแต่เมรยางค์เล็กคล้ายหู 2 อันที่โคน ขอบเรียบ เป็นคลื่นเล็กน้อย ในอ่อนสีเขียวอ่อน ใบแก่คล้ายหนังบาง เกลี้ยงด้านล่างมีขนสีทองบนเส้นใบหลัก มีต่อมสีเข้มเล็กๆ และมีต่อมใหญ่กว่า 2 ต่อมที่โคน ก้านใบยาว 3-7 ซม. เล็กเรียว ปลายป่องเกลี้ยง หรือมีขนสีน้ำตาลอมเหลืองกระจาย ทูใบยาว 5-7 มม. เล็กเรียวมีโคนป่อง มีรยางค์คล้ายหนวดแมว แต่ไม่ใช่ขนเป็นกระจุกอยู่บนตาเกล็ดที่ปลายกิ่ง ดอกเพศผู้ออกเป็นช่อเรียวยาว 6 (11) ซม. มักเป็นรูปคล้ายไม้กวาด ดอกอยู่เป็นกลุ่มๆ ละ 4 ดอก ที่ส่วนใบประดับยื่น ขนาดประมาณ 1.5 มม. พุกสิบเลี้ยงเป็นหมวด กerner เพมี 12 อัน ดอกเพศเมียออกเป็นช่อ มีดอกเฉพาะที่ปลายยอดลงมา $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{4}$ ของ ช่อเท่านั้น พุกสิบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยมสีเขียวสดขนาดประมาณ 5 มม. ก้านกerner เมียเล็กเรียว ผล ขนาดถึง 1.2(1.5) ซม. ก้านหนาแข็งยาว 2-4 มม. สีเขียวอ่อนออกเป็นช่อยาวได้ถึง 90 ซม. มีผลเฉพาะตอนปลาย ประมาณ $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{4}$ ของช่อ มีใบประดับคล้ายใบกว้างได้ถึง 5 มม. ยาวถึง 10 มม. จักเป็นพุชัด ที่โคนมีกึ่ง เลี้ยงติดอยู่ ก้านกerner เมียยาว 10 มม. ติดที่ปลาย ร่วงง่าย มีน้ำและเกลี้ยวยาว 4 มม หัวไปเมื่ออ่อนและ ค่อยๆ น้ำดูดลงเมื่อแก่ พับหัวไปในภาคใต้ เป็นไม้ซันร่องในป่าค่อนข้างโปรด และซ่องว่างในป่า ดินเดิมที่ต้ำ เป็นชนิดที่มีการผันแปรมาก

ข้อมูลอ้างอิง : ไวนอน การ์ดเนอร์ พินดา สิงห์อุนทร กองงานค่า ข้อมูลดูแลป่าฯ ได้ป่าฯ ได้เล่ม 2 – พิมพ์ครั้งที่ 1-กรุงเทพฯ : โครงการจัดพัฒนาป่าฯ. 2559. 792 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพแรก : <https://www.flickr.com/photos/adaduitokla/15430261207/in/photostream/>

ภาพใน : ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

