

ไม้ต้น ขนาดเล็ก สูง 2 – 12 ม. ไม้ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลมหรือรูปไข่ทึบ แตกกิ่งต่ำ กิ่งก้านมีขนปกคลุม เปลือกสีน้ำตาลเข้ม แตกเป็นสะเก็ดสีเหลี่ยม ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปไข่แกมรูปขอบขนาน รูปใบหอกหรือรูปไข่แกมใบหอก กว้าง 1- 3 ซม. ยาว 3-20 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบสอบขอบใบส่วนปลายใบจักฟันเลื่อย ผิวใบด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างมีขนอ่อนนุ่ม เส้นแขนงใบข้างละ 8 -12 เส้น ก้านใบยาว 3 – 5 มม. ดอก : สีเหลืองนวล มีกลิ่นหอม ดอกแยกเพศต่างต้นออกเป็นช่อแบบ ช่อกระจุกตามซอกใบและกิ่ง ช่อดอกยาว 27 -30 ซม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ด้านนอกมีขน กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ช้อนเหลื่อมกัน ดอกเพศผู้เกสรสีน้ำตาลแดง 20 อัน ดอกเพศเมียมีก้านชูเกสรเพศเมีย 3 อัน เชื่อมติดกันที่ฐาน ดอกบานเต็มที่กว้าง 4 -10 มม. ผล ผลแบบผลมีเนื้อ รูปกลม ขนาด 3 – 6 มม. ผิวเกลี้ยง เมื่อสุกออกสีดำ เมล็ดเล็ก ทรงกลมแบน ผิวใส ระยะเวลาการเป็นดอก - ผล : ดอก ก.ย. – ต.ค. ผล พ.ย. – ธ.ค. ป่าดิบหรือป่าเบญจพรรณ ประโยชน์ ส่วนของต้นปักไว้ในทุ่งนาเพื่อไล่แมลงศัตรูพืช ใบทำปุยและอาหารสัตว์ รักษาโรคท้องร่วงและโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร



ข้อมูลอ้างอิง : เว็บบอร์ดกรมวน, ปศุสัตว์ และสวนพฤกษศาสตร์, ไม้ป่าในดินของไทย 1, ครั้งที่ 2, กรมเพาะ ไร่พันธุ์พืช, เล่ม 1, กรุงเทพฯ : 2552 (หน้า 291 )

ภาพประกอบ : ภาพดอก/ผล : <http://tropicaltheferns.info/image.php?id=Eurya+acuminata>

ภาพใบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี