

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น ใหญ่ ไม่อาศัยไม้อื่น ผลัดใบช่วงสั้น สูงได้ถึง 30 ม. เรือนยอดค่อนข้างแน่น ลำต้นเป็นลำต้นตรง มีพูพอนแผ่กว้างตามอายุ เปลือกสีเทาอ่อนถึงน้ำตาลออกชมพู เรียบหรือขรุขระเล็กน้อย เปลือกในสีส้มอ่อน มียาวสีขาวจำนวนมาก ใบ กว้าง 4-12 ซม. ยาว 9-25 ซม. ออกสลับ (ใบบนๆ ออกกึ่งตรงข้าม) เรียงเวียน รูปไข่กว้างหรือแคบ หรือขอบขนานแกมรี ปลายทู่หรือเรียวแหลม โคนทู่หรือรูปหัวใจไม่เบี้ยว ขอบเรียบ หรือจักซี่ฟันตื้นห่างๆ ใบแก่เนื้อคล้ายหนังบาง เกลี้ยงหรือมีขนอ่อนบนเส้นใบด้านบน มีขนอ่อนเล็กๆ บน เส้นใบด้านล่าง เส้นใบจากโคนยาว $1/4-2/3$ ของใบ มักไม่เท่ากัน เป็นมุมแหลมชัน แตกแขนง ไม่ยาวไปถึงขอบ มีต่อมไขที่ซอกใบ เส้นใบข้าง 4-9(12) คู่ เป็นวง เส้นใบย่อยคล้ายชั้นบันไดหรือกึ่งร่างแห เห็นได้ด้านบน ฐานด้านล่าง ก้านใบยาว 3-12 ซม. เกลี้ยงหรือมีขนอ่อน มีสะเก็ด หูใบยาว 0.5-1.5 ซม. ร่วงเร็ว กิ่งต้นหรือพบน้อยกึ่งกลาง มีขนละเอียดเมื่ออ่อน ต่อไปเป็นสะเก็ด ผล ขนาด 2.5-3.5(5) ซม. มีก้านชัดยาว 2-6 ซม. ออกเป็นช่อแน่นบนปุ่มแข็งหรือบนลำต้นใหญ่ลำ ยาวได้ถึง 7 ซม. ทั้งหมดนี้พบตามลำต้นและกิ่งใหญ่ๆ ตั้งแต่ระดับพื้นดินถึงเรือนยอดต่ำๆ ผลทรงกลมถึงรี หรือรูปลูกแพร์ ปลายแบนหรือบวม มีช่องเปิดนูน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 มม. ค่อนข้างเรียวไปยังโคนเป็นคอผลเล็กเรียว ยาวได้ถึง 8 มม. มักมีสันและขีดจางๆ สุกสีชมพูหรือแดงเข้ม มีจุดสีขาวเล็ก หรืออาจจะยังมีสีเขียวสดแม้ว่าจะสุกเต็มที่ เกลี้ยงหรือมีขนอ่อนละเอียด พบทั่วไปในป่ารุ่นและป่าผลัดใบ-ป่าไผ่ หรือป่าดิบที่ถูกทำลาย สูงได้ถึง 1,500 ม. มักพบใกล้ลำธารหรือใกล้ชายฝั่งแม่น้ำ



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอนด์ ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาพฤกษศาสตร์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาพฤกษศาสตร์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

