

ไม้ต้น ไม้ผลัดใบหรือผลัดใบบางส่วน สูงถึง 27 ม. ลำต้นใหญ่ แตกกิ่งต่ำ ในที่โล่ง โคนมักเป็นร่อง หรือมีพูพอน เปลือกสีเทาอ่อนหรือสีแดงมีน้ำเลี้ยงใสๆ ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีดำเมื่อถูกอากาศ ใบ รูปรีแคบ กว้าง 2.5-5 ซม. ยาว 8-16 ซม. ปลายเรียวแหลม โคนแหลม ใบอ่อนสีม่วงอมเทา ใบแก่คล้ายแผ่นหนัง บางเกลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นกลางใบนูนด้านบน เส้นใบ 7-14 คู่ ค่อนข้างนูนทั้งสองด้าน เส้นใบย่อยเป็นร่างแหชัดเจนทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 1.2-5 ซม. เล็กเรียว โคนบวม ดอก สีขาว กลิ่นหอมอ่อน เป็นช่อแตกแขนงยาว 4-10 ซม. แกนกลางช่อเกลี้ยงหรือมีขนสั้นนุ่ม กระจาย ก้านดอกยาว 4-8 มม. สีแดง เกลี้ยง เป็นข้อต่อ มีขนสั้นนุ่ม กลีบเลี้ยงยาว 6-1 มม. สีชมพูอมส้มถึงสีแดงเข้ม แยกเปิดไม่สม่ำเสมอและแยกด้านเดียว เกลี้ยง ด้านนอก กลีบดอกยาว 11-18 มม. คล้ายสายเข็มขัด ปลายจะเริ่มโค้ง เกลี้ยงด้านนอก ยกเว้นตามขอบ ร่วงเร็ว เกสรเพศผู้ 5 อัน ยาว 7-10 มม. แยกออกจากกลีบดอกโดยมีก้านสั้น ยาวประมาณ 6 มม. รังไข่เกลี้ยงมีก้านสั้น รูปไข่เบี้ยว ก้านเกสรเพศเมียเล็กเรียวติดด้านข้าง ผล : รูปไข่เบี้ยวหรือคล้ายมะม่วงผลเล็ก ยาว 4-5 ซม. มักแบน เล็กน้อย เมื่อสุกสีเหลืองขึ้นถึงสีออกดำ เกลี้ยงและเป็นมัน ด้านในมีเนื้อนุ่ม มีก้านติดห่างจากแกนกลางผลยาวประมาณ 1 ซม. ไม่มีปีก เมล็ดใหญ่ เปลือกบาง พบในป่าดิบ สูง 600 ม.



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต, ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.- กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

