

ไม้ต้นขนาดเล็ก ไม้ผลัดใบ สูงได้ถึง 15 ม. เรือนยอดแคบและกิ่งก้านเล็กเรียว กิ่งตัน(ไม่มีมดอาศัยอยู่) เปลือก สีเลือนนกอเมเทาซุ่น แตกเป็นแผ่นตื้นแนวตั้ง ช่องอากาศเล็กจำนวนมาก เปลือกโยสีส้มแก่ ค่อนข้างแห้ง ใบ กว้าง 5-8 ซม. ยาว 10-18 ซม. รูปไข่แคบ ไม่จักเป็นพู ปลายแหลมสั้นหรือเรียวแหลมเล็กน้อย โคนทู่ กิ่งรูปหัวใจ หรือกึ่งกันปัด ก้านใบติดห่างขอบใบมากกว่า 1 มม. มักโค้งขึ้นที่ใกล้ๆ โคนใบ ขอบใบเรียบไม่เป็นคลื่นโค้งขึ้นเล็กน้อย ใบอ่อนสีครีมมีขนหยิกสีส้ม ใบแก่ด้านบนสีเขียวเข้มซุ่น เกลี้ยง มีนวลเล็กน้อยและเกลี้ยง ด้านล่างมีขนหยิกสีสนิมบนเส้นใบ มีต่อมเล็กหลายต่อมที่ใกล้โคน ก้านใบยาว 5-8 ซม. เล็กเรียว สีม่วงแดง เกลี้ยง หรือมีขนหยิกสีสนิม พูใบรูปสามเหลี่ยม กว้างประมาณ 4 มม. กว้างประมาณ 10 มม. โค้งกลับ มีขนละเอียดสีสนิม ร่วงเร็ว ดอกเพศผู้ อยู่ใต้รอยแผลใบ ชูช่อแข็งออกมาจากกิ่ง เป็นกลุ่มประมาณ 20 ดอก ออกเป็นช่อแคบไม่แตกแขนง ยาวได้ถึง 18 ซม. แกนกลางมีขนสีน้ำตาลลอมสัมนาแน่น ใบประดับย่อยยาวได้ถึง 8 มม. หยักลึกไม่เป็นระเบียบ มีต่อมอยู่ที่แต่ละปลายหยัก ขนหยิกสีส้ม กลีบเลี้ยงมี 2 พู เกสรเพศผู้มี 2(3) อัน ดอกเพศเมียคล้ายกับดอกเพศผู้ แต่ดอกอยู่กลุ่มละ 3 ดอก ผล ขนาด 4 มม. มีก้านยาว 2-3 มม. มี 2(3) พูแบนเล็กน้อย มีกลีบเลี้ยงติดที่โคน ยอดเกสรเพศเมียเล็กติดทน ไม่มีหนามหรือขน มีต่อมเป็นจุดสีเหลืองอ่อน ฝักออกง่าย พบทั่วไปตามข้างและป่าร่น สูงได้ถึง 400 ม. ขึ้นได้ในที่แล้งและดินเลว พบที่ จ.ตรัง นราธิวาส



ข้อมูลอ้างอิง : ไชยอน เกษมณีนธ์ ศึกษาศาสตร์เกษตร เทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี - ทีมทำหนังสือ
ภาพประกอบ : ศุภวิชญ์และทีมงานกิจกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี