

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้นกลาง สูงได้ถึง 20 เมตร โคนเป็นร่องเล็กน้อยหรือมีพูพอน สีเทาอ่อนถึงน้ำตาลแดง เรียบหรือแตกเป็นร่องละเอียด ต้นแก่เป็นเกล็ดหยาบ เลือกลงในสีน้ำตาลออกชมพู ใบ กว้าง 3-7 ซม. ยาว 7-16 ซม. มีรูปร่างหลายแบบและขนาดแตกต่างกัน ส่วนมากรูปขอบขนานแกมรี ถึงกึ่งรูปไข่กลับ ปลายทู่หรือหรือแหลมถึงเรียวแหลมกว้างโคนทู่หรือรูปไข่ เนื้อใบคล้ายหนังหนา ด้านบนขน เส้นกลางใบเป็นร่องด้านบน เส้นใบ 6-12 คู่ เรียวเล็กห่างกัน เป็นร่องตื้นด้านบน เส้นขอบใบ 1-2 เส้น มักจาง เส้นใบย่อยจากทั้ง 2 ด้าน ก้านใบยาว 0.6-1.2 ซม. มีปีกเล็กๆพองที่โคน กิ่งสีครีมถึงเทาออกขาว ไม่เป็นสันหรือเป็นมุม เรียบถึงเป็นสะเก็ดเล็กๆ ดอก ขนาดประมาณ 0.6 ซม. เล็ก สีขาวถึงครีม มีแต้มสีเขียวหรือชมพูเรื่อ กลิ่นเปรี้ยว ออกเป็นช่อเล็กเรียวแต่แขนยาว 4-8 ซม. ส่วนมากที่ง่ามใบหรือตามกิ่งใต้ตาใบ บางทีพบที่ปลายกิ่ง ก้านช่อดอกยาวได้ถึง 3 ซม. มักแตกแขนงหลายแขนงที่โคน แกนกลางและแขนงช่อดอก ค่อนข้างแบนหรือเป็นมุม 4 มุม เหล็กเกลียว ไม่มีก้านดอก ถ้วยฐานดอกสูง 2-3 มม. รูปกรวยถึงกึ่งรูปประฆัง หรือรูปโถ ไม่มีก้านถ้วย สีเขียวอมเหลืองอ่อน เปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อดอกบาน มีจุดต่อมละเอียด กลีบเลี้ยง 4 กลีบ ยาวน้อยกว่า 1 มม. กลม กลีบดอก 4 กลีบ ขนาด 1.5-2.5 มม. กลม เชื่อมกันเป็นตาดอกและร่วงเมื่อดอกบาน เกสรตัวผู้ยาว 2-3 มม. ก้านเกสรตัวเมียยาวประมาณ 1 มม. อ้วนล่ำ สั้นกว่าเกสรตัวผู้มาก ผล ขนาด 1.2-1.5 ซม. กลมถึงรี ปลายมุมเล็ก มีกลีบเลี้ยงเล็กเป็นขอบ สุกสีชมพูถึงแดงเข้ม แล้วเป็นสีดำอมม่วง พบทั่วไปในป่าดิบที่ต่ำ ทั่วภาคใต้ บางทีพบในป่าพรุน้ำจืดหรือป่าที่สูง



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชยอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

