

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้นเล็กหรือขนาดกลาง ไม้ผลัดใบ สูงได้ถึง 22 เมตร ลำต้นตรง เรือนยอดแน่นไม่เป็นระเบียบ เปลือกสีครีมถึงน้ำตาลอมเทาหรือน้ำตาลแดงเข้ม เรียบหรือแตกเป็นรอยเล็ก และลอกเป็นแผ่น เปลือกในสีออกชมพูถึงแดงเข้ม หรือน้ำตาลแดง มักมีริ้วตามยาวสีขาว ใบ กว้าง 1.5-6 ซม. ยาว 3.5-12 ซม. พบน้อยที่กว้างได้ถึง 8 ซม. ยาวได้ถึง 18 ซม. ออกสลับ หรือแผ่ระนาบเดียวบนกิ่ง รูปไข่หรือรี ปลายเรียวแหลม โคนรูปกลม ขอบ เรียบ ยอดอ่อนสีน้ำตาลอมส้ม ใบแก่เนื้อคล้ายหนังบ้าง สีเขียวออกดำเป็นมันด้านบน กลี้ยงทั้งสองด้าน ไม่มี ต่อมน้ำมันใบหลัก 1 เส้นจากโคน เส้นใบโค้ง 5-9 คู่ ไปเชื่อมกันจางๆใกล้ขอบ เส้นใบย่อยเป็นร่างแห ละเอียดยมาก เห็นไม่ชัดด้านบน จางด้านล่าง ก้านใบยาว 0.3 -1.2 ซม. หูใบกว้าง 0.6-2.2 มม. ยาว 3-6.5 มม. รูปไข่กลับเบี้ยว ร่วงเร็ว ดอก เล็ก สมมาตร แยกเพศ มีดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่คนละต้น ออกเป็นช่อแน่น ไม่มีก้านช่อที่ง่ามใบ ก้านดอกยาว 3-5 มม. มีขนแน่น กลีบเลี้ยง 4 กลีบ ยาว 1.5 -3 มม. ช้อนทับกัน ด้านนอก 2 กลีบแตกต่างจาก 2 กลีบใน รูปไข่ถึงกลม ไม่มีกลีบดอก หรือหายากที่พบคล้ายเป็นก้าน 1 กลีบ ดอกตัวผู้ ขนาด 2.5-4 มม. สีเขียวอ่อนถึงออกขาว มีจานฐานดอกเป็นวงสีแดง เกสรตัวผู้เชื่อมกันเป็นเส้น สูง 3-5 มม. มีก้านชูอับเรณูประมาณ 8 อัน กางออก ยาว 0.5-1 มม. เป็นกลุ่มล้อมรอบรังไข่เป็นหมันที่ปลาย ดอกตัวเมีย ยาวได้ถึง 7.5 มม. สีครีมหรือเขียวแกมเหลือง รังไข่ยาว 1-1.3 มม. มีหนามแน่น จานฐานดอกที่โคนเป็นซี่ฟัน ก้านเกสรตัวผู้ขยายแตกกลีบเป็นสามง่าม ยาว 0.3-1.2 มม. ผล ยาว 0.8-1.8 ซม. สีเขียวสดสุกสีเหลืองถึงแดงอมส้ม แล้วเป็นสีน้ำตาลอ่อน ทรงกลมหรือรูปไข่ ปกคลุมด้วยหนามเล็กเรียว 3 มม. แก่แตกออกเป็น 3 ส่วน 2 ครั้ง แต่ละส่วนมี 1 เมล็ด เมล็ดยาวประมาณ 6 มม.สีดำมัน มีเยื่อหุ้มเมล็ดบางสีแดงหุ้ม 1/3 ด้านบน พบทั่วไปทั้งในป่าดิบเดิมและป่ารุ่น โดยเฉพาะใกล้ทะเลและในที่ต่ำ



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์, ฟินดา สัทธินทร กองกานดา ชยามฤต ไม่ป่าภาคใต้ 2 - พิมพ์ครั้งที่ 1-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปพ. 2559. 792 หน้า
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

