

Aglaia teysmanniana (Miq.) Miq.


สังเคียดขอบใบคลื่น

วงศ์ MELIACEAE

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น

เล็กถึงขนาดกลาง สูง 2-15(24)ม. เรือนยอดกลมแน่น เปลือก สีน้ำตาลอมส้มอ่อนถึงสีน้ำตาลอมเทา แตกเล็กน้อย เปลือกชั้นกลางไม่ชัด ชั้นในสีส้มถึงน้ำตาลเข้ม มียางขาวบางๆ ใบ ยาวได้ถึง 60 ซม. ใบประกอบแบบขนนกยอเดี่ยว ใบย่อย 2-4 คู่ ออกสลับหรือกึ่งตรงข้าม กว้าง 2-8 ซม. ยาว 5-25 ซม. รูปรีบางที่พบรูปไข่กลับ ปลายเรียวแหลม โคนกลมเบี้ยวหรือรูปลิ้ม ใบแก่ด้านบนสีเขียวเข้ม เกลี้ยง ด้านล่างมีขนรูปดาวสีเหลืองอ่อน(หรือบางที่มีเกล็ดรูปดาว) แน่นแต่ไม่คลุมทั้งหมดบนเส้นกลางใบ และบนผิวใบขนซ้อนกันแต่เห็นผิวใบระหว่างขน บางที่เมื่อแก่จะเกลี้ยง เส้นใบ 9-21 คู่ โค้งชันใกล้ขอบ ฐานด้านบนเล็กน้อย ใบข้างก้านใบย่อยยาวได้ถึง 1 ซม. ใบปลายก้านใบย่อยยาวได้ถึง 2 ซม. กิ่งเรียวเล็ก ขอบเป็นคลื่น เมื่ออ่อนมีขนรูปดาวสีน้ำตาลอมเหลืองอ่อนแน่น ดอก ยาว 1.5-2 มม. สีเหลืองถึงส้มอ่อน รูปค่อนข้างกลม กลิ่นหอม ช่อดอกยาวได้ถึง 15 ซม. ก้านช่อดอกและแกนกลางเป็นเหลี่ยม ก้านดอกยาวได้ถึง 2 มม. กลีบเลี้ยงรูปถ้วย ปลายจักตื้น เป็นแฉกกลม 4-5 แฉก มีเกล็ดแน่น กลีบดอก 3-5 กลีบ รูปไข่กลับ เกลี้ยง หลอดเกสรเพศผู้สั้นกว่ากลีบดอก รูปถ้วย ขอบโค้ง อับเรณู(6)7-9 อัน โพล์พื้นหลอดเล็กน้อย ผล กว้าง 1.3-2 ซม. ยาว 1-2.2 ซม. ออกเป็นช่อยาวได้ถึง 10 ซม. มีได้ถึง 4 ผล ผลเกือบกลม มีเกล็ดสีน้ำตาลอมครีมอ่อนหรือสีน้ำตาลออกแดงเมื่ออ่อน เมื่อก่สีส้มอมชมพูอ่อนถึงสีชมพูและแตกออกเป็น 3(4) ส่วน แต่ละส่วนมี (0)1 เมล็ด มีเนื้อสีแดงอมส้มหุ้มมิด พบในป่าดิบ หรือป่าดิบ-ป่าไผ่ที่ต่ำ มักพบตามเชิงเขาหินปูน



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2559. 792 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

