

ชื่อพื้นเมือง :



ไม้พุ่ม หรือไม้ต้นกิ่งพุ่ม ไม้ผลัดใบ สูงได้ถึง 10 เมตร ลำต้นมีหลายลำ หรือแตกแขนงใกล้โคนต้น เปลือกสีเทาอ่อนถึงน้ำตาลเข้มเกลี้ยง เปลือกในสีขาวหรือครีม มีชั้นบางๆสีแดงเข้ม ใบ กว้าง 2.50-10 ซม. ยาว 6- 22 ซม. ออกสลับหรือตรงข้าม รูปไข่กลับถึงขอบขนาน หรือรูปไข่แคบ ปลายแหลมถึงเรียวแหลม คุณกลมหรือเกือบรูปหัวใจ ก้านปัด ก้านใบติดลึกจากขอบถึง 14 มม. ขอบจักซี่ฟันตื้นปลายซี่มีต่อม กิ่งอ่อนสีเขียวอ่อนถึงม่วงแดงหรือสีออกน้ำตาล ขนกำมะหยี่ ใบแก่สีเขียวเข้ม เกลี้ยงหรือมีขนเล็กน้อยด้านบน ด้านล่างมีเกล็ด มักมีกลุ่มขนที่ซอกเส้นใบ เส้นใบ 3-7 เส้นออกจากโคนใบ เส้นล่างมีตุ่มเล็กสีดำ 2-6 ด้านบน เส้นใบข้าง 5-8 คู่ แต่ละคู่ห่างไม่เท่ากัน ก้านใบยาว(0.5) 2-11 ซม. มีขนประปราย ทุใบรูปสามเหลี่ยม ขนาด 2-4 มม. ดอกเป็นช่อไม่แตกแขนงที่ปลายกิ่ง พบข้างตามซอกใบบนออกเดี่ยวหรือเป็นคู่ ดอกเพศผู้ขนาด 3-5 มม. สีเขียวอ่อนหรือเหลืองอ่อน กลิ่นหอม ออกเป็นช่อยาว 2-25 ซม. มีดอกถึง 9 ดอกอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่ม ก้านยาว 1-2 มม. กลีบเลี้ยง 2-4 กลีบ รูปรีแกมรูปไข่ ยาว 1.5-3 มม. ปลายโค้ง มีขน เกสรเพศผู้มี 17-35 อัน ยาว 1.2-3.5 มม. ดอกเพศเมียขนาด 3-4 มม. สีเขียวถึงเหลืองอ่อนหรือสีออกแดงเป็นช่อยาว 8- 22 ซม.ก้านดอกยาว 2- 4.5 มม.(ในผล) กลีบเลี้ยงยาว 4-6 มม.รูปชวดคอยาวมี 2 พู สั้น ไม่เท่ากัน เมื่ออ่อนแนบชิดรอบรังไข่ แล้วแยกออกจากกันรวดเร็วทั้งรอยแผลเป็นวงในผล รังไข่ 3-4 ช่อง สีเขียวอ่อนถึงแดงเข้ม มีหนามหนาแน่น ยอดเกสรเพศเมียยาว 6-9 มม. รวมก้านเกสรเพศเมียสั้น ผล ขนาด 1-1.5 ซม. สีเขียวถึงแดงเข้มหรือสีม่วงมีเกล็ดสีเหลืองเป็นพู 3-4 พู มีหนามหุ้ม เมล็ด ขนาด 4-5 มม. สีนํ้าตาลคล้ายหินอ่อน พบทั่วไปในภาคใต้ ทั้งป่าเดิมและป่ารุ่น สูงถึง 800 เมตร มักขึ้นริมน้ำหรือบนหิน

ข้อมูลอ้างอิง : ไข่มอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้เล่ม2 - พิมพ์ครั้งที่ 1-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2559. 792 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มรดกอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มรดกอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

