

สัตบรรณ (ตีนเป็ด)

Alstonia scholaris (L.) R. Br.

วงศ์ APOCYNACEAE

ชื่อพื้นเมือง :



ไม้ต้น สูงถึง 40 ม. อาจผลัดใบ ต้นเล็กเรื้อนยอดเป็นชั้นทรงเจดีย์ เมื่อต้นโตเรื้อนยอดแน่นรูปทรงกระบอก โคนต้นมีพูพอน เปลือก สีน้ำตาลอมครีม เปลือกในสีส้มอ่อนถึงน้ำตาลอมเหลือง มียางขาว ใบ รูปรี รูปช้อนหรือรูปไข่กลับแคบ กว้าง 1.5-6(8) ซม. ยาว 5-20 (32) ซม. ออกเป็นวงรอบข้อ 4-8 ใบ ปลายแหลม สัน โคนสอบ ใบแก่เนื้อคล้ายหนังบาง ด้านล่างเกลี้ยง สีออกขาว เส้นใบ 20-40 คู่ ขนานกัน ทำมุมตั้งฉากกับ เส้นกลางใบ เส้นร่างแหเยียด เห็นชัดด้านล่าง ก้านใบยาว 0.7-1.5(3) ซม. ด้านบนเป็นร่อง มีหูใบนุ่มรูปสาม เหลี่ยม มักมีรอยแผลเป็นระหว่างหูใบที่หูใบหลุดร่วงไป ดอก สีขาว ครีมหรือเขียวอมเหลือง ตาดอกเป็นช่อ แบบช่อซี่ร่ม ช่อที่ปลายยอด ยาว 3-9(13) ซม. แกนกลางช่อมีขนละเอียด ก้านดอกย่อยยาวประมาณ 1 มม. กลีบเลี้ยงยาว 1-2 มม. มีขน กลีบดอกยาว 5-10 มม. โคนเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็นกลีบยาว 2-5 มม. เรียงซ้อนไปทางซ้ายในตาดอก มีขนที่ครึ่งบนทั้งสองด้าน รังไข่มีขน จานฐานดอกเล็กหรือไม่มี ก้านเกสรเพศผู้ ยาว 3-5 มม. ผล กว้าง 0.2-0.3 ซม. ยาว 21-56 ซม. ออกเป็นคู่ เกือบแก่แตกออกเป็น 2 ส่วน เมล็ดมีขน จำนวนมาก ขนาด 4-8 มม. ปลายหู่หรือกลมทั้งสองด้าน พบทั่วไปในภาคใต้ ทั้งในป่าเดิมและป่าที่ถูกแผ้วถาง ความสูงถึง 1000 ม.

ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชยอน พินตา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปพ. 2558. 768 หน้า
ภาพประกอบ : [http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Alstonia0scholaris0\(L.\)0R.Br.](http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Alstonia0scholaris0(L.)0R.Br.)



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

