

स्याดำ

Shorea pauciflora King

DIPTEROCARPACEAE

ไม้ต้นไม่ผลัดใบ สูงถึง 40 เมตร มีพุ่มสูงถึง 2.5 เมตร เปลือก สีน้ำตาล แตกตามแนวตั้งและมีเกล็ด เปลือกในสีแดงถึงชมพูอ่อน ใบ รูปขอบขนานถึงรูปไข่ กว้าง 3.8-5 เซนติเมตร ยาว 7.5-13 เซนติเมตร ปลายแหลมสั้น โคนห้หรือกลม เนื้อคล้ายหนังบาง ด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านล่างสีอ่อน มีขนสีน้ำตาลอ่อน โดยเฉพาะบนเส้นใบ ตามซอกใบล่างเกลี้ยงหรือมีตุ่มขน ใบแก่แห้งสีน้ำตาลแดง เส้นกลางใบแบนด้านบน เส้นใบเล็ก 8-9 คู่ ชัดด้านล่าง เส้นใบย่อยเป็นชั้นบันไดเรียบ ก้านใบและกิ่งอ่อนมีกระจุกขนสีน้ำตาลอ่อนเล็ก แล้วเกลี้ยง ดอก ขนาด 1-1.5 เซนติเมตร สีเหลืองอ่อน กลิ่นหอม ช่อดอกแตกแขนง 2-3 ชั้น ยาว 5-12 ซม. มีขนสีน้ำตาลทอง ก้านดอกยาว 2 มิลลิเมตร พุกสืบเลี้ยงมีขนแน่น กลีบดอกรูปขอบขนานกว้าง 3 มิลลิเมตร ยาว 10 เซนติเมตร ปลายห้ โคนบิด มีขนด้านบน ร่วงพร้อมกัน เกสรเพศผู้ 15 อัน ยาวไม่เท่ากัน ก้านชูอับเรณูแคบไป ยังปลาย อับเรณูรูปไข่ มีรยางค์โค้ง ยาว 2-2.5 เท่าของ อับ มีขนที่ปลาย รังไข่ยาว 1.3 มิลลิเมตร รูปกรวยแกม รูปไข่ มีคอชัด ขนแน่น ก้านเกสรเพศเมียยาวกว่ารังไข่เล็กน้อย ผล ปีกยาว 3 ปีก รูปช้อน กว้าง 1-1.5 เซนติเมตร ยาว 6-10 เซนติเมตร มีเส้น 8-11 เส้น 2 ปีกสั้นกว้างถึง 0.5 เซนติเมตร ยาวถึง 4 เซนติเมตร ตัวผลรูปไข่กว้าง ยาว 0.8-1.3 เซนติเมตร โคนปีกหุ้มผล

พบน้อยในป่าดิบที่ต่ำ สูง 200-600 เมตร



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยาฤดี ไม้ป่าภาคใต้ – พิมพ์ครั้งที่ 1-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2558. 768 หน้า: ภาพประกอบ

ภาพประกอบ : <https://www.flickr.com/photos/reulim/49907929311/in/photostream/>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)