

ไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่ สูงได้ถึง 20 เมตร อาจไม่ผลัดใบ ลำต้นเป็นร่อง มีพูพอนแคบที่โคนต้น เปลือกสีน้ำตาลอมเทาถึงน้ำตาลแดง แตก เปลือกในสีชมพู มีซีสต์อ่อน เนื้อไม้สีเหลืองอ่อนและแข็ง ใบ กว้าง 3-9 เซนติเมตร ยาว 6-16 เซนติเมตร ออกสลับเวียน รูปไข่ถึงรี ปลายใบเรียวแหลม โคนรูปปลีกร้างถึงกลม อาจเบี้ยวเล็กน้อย ขอบไม่จัก ใบแก่คล้ายหนังบาง เกลี้ยงด้านบน ด้านล่างมีเกล็ดแน่น ใบแก่เหี่ยวสีเหลือง เส้นใบ 3(5) เส้นออกจากโคนใบ คู่ข้างยาวขึ้นไปประมาณ $\frac{2}{3}$ ของความยาวใบ เส้นใบข้าง 2-4 คู่ สูงชัน เส้นใบย่อยชัดด้านล่าง ก้านใบยาว 3-4 เซนติเมตร เล็กเรียว ป่องทั้งสองด้าน มีขนเมื่อยังอ่อน แล้วเกลี้ยง ดอกสีขาวถึงชมพูอ่อน ออกเป็นช่อแตกแขนง ยาว 10-20 เซนติเมตร ที่ปลายกิ่ง แกนกลางช่อมีเกล็ดขนแน่น กลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อน จักจี้เป็นแฉกรูปสามเหลี่ยมแคบมีเกล็ดขนแน่นด้านนอก ด้านในเกลี้ยง กลีบดอก 5 กลีบสีขาว แยกกัน กว้าง 1 มิลลิเมตร กลีบดอกยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร รูปช้อน ไม่มีต่อมที่โคน เกลี้ยงทั้งสองด้าน เกสรเพศผู้สมบูรณ์หลายอัน แยกกัน หรือเชื่อมเป็น 5 มัดไม่ชัด อยู่บนฐานดอกค่อนข้างนูน เกสรเพศผู้เป็นหมันคล้ายสายหนัง 5 อัน สั้นกว่าเกสรที่สมบูรณ์ รังไข่ 3 ช่อง รูปไข่ มีสันตามยาว 3 สัน มีเกล็ดแน่น ก้านเกสรเพศเมียเล็ก เรียว 1 อัน ยอดเกสรเพศเมียไม่ชัด ผล กว้างได้ถึง 3.5 เซนติเมตร ยาวได้ถึง 1.2-1.5 เซนติเมตร รูปรี มีปีกตามยาว 3 ปีก แก่ไม่แตก

ป่าผลัดใบสูงหรือป่าดิบที่ต่ำ พบทั่วไปในคาบสมุทรมลายูเซีย น่าจะพบในภาคใต้ด้วย



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ ฟินคา สิริสุนทร กองกานดา ชยาฤต. ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2559. 792 หน้า: ภาพประกอบ

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

