

สีฟันกระปือ (ไอ)

วงศ์ PHYLLANTHACEAE

ชื่อพื้นเมือง : กระปือ ขนหนอน ไอ มะแก่ สะเหล่า สามพันดา

ไม้ต้น สูงได้ถึง 13 เมตร หรือเป็นไม้พุ่มรอเลี้ยง
ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปรีหรือรูปไข่กลับ กว้าง 1-6 ซม.
ยาว 2.5-14 ซม. โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบ
เรียบหรือหยักมน หลังใบมีขนยาวห่างๆ ดอก ออกเป็น^{ช่อ}กระจุก ตามซอกใบสีเขียว กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปสาม
เหลี่ยม ยาว 0.8-1.5 มม. กลีบดอก 5 กลีบโคนเสื่อน
แคบ หรือเป็นรูปช้อน ปลายกลม เกสรเพศผู้ 5 อัน^{ยอด}เกสรเพศเมีย^{จักร}เป็น 2 แฉก ผล ทรงกลม ปลาย
เว้าเป็นสอง พุ่ล็กน้อย สีดำ ขนาดผ่าศูนย์กลาง 4.5-6.5
มม. เมล็ด ค่อนข้างกลม มีร่องลึกด้านข้าง สีน้ำตาล ยาว
3-3.5 มม. พบระจาในอินเดีย เนปาล จีนตอน ใต้
ใต้หวัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงออสเตรเลีย
เนื้อ ในประเทศไทยพบทุกภาค ตามป่าผลัดใบ และ
ป่าดิบชื้น จนถึงระดับความสูง 1,000 เมตร



ข้อมูลอ้างอิง : http://www.qsbq.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=2389
ภาพประกอบ : http://www.qsbq.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=2389



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

