


*Guioa diplopeta* (Hassk.) Radlk.

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น ไม้ผลัดใบ สูงได้ถึง 18 เซนติเมตร เปลือกสีเทาอ่อนถึงน้ำตาลเข้มอมเทา เรียบ ถึงแตกสะเก็ดและลอก เปลือกในสีชมพูถึง น้ำตาลอ่อน ใบ มี 3 ใบ หรือใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ มีใบย่อย 2-6 คู่ ออกตรงข้ามหรือสลับ แกนกลางใบไม่เป็นปีก ใบย่อยกว้าง 1-7 มม. ยาว 3-24 เซนติเมตร ใบล่างๆ เล็กกว่าใบบน ๆ เล็กน้อย รูปไข่แคบถึงรี ปลายเรียวหรือแหลมสั้น มักโค้งและเบี้ยว ขอบเรียบหรือจักซี่ฟันห่างใกล้ปลายเท่านั้น ยอดอ่อนมีขนสีน้ำตาลละเอียด ใบแก่คล้ายหนังเกลี้ยงหรือมีขนเล็กน้อยบนเส้นใบ มีจุด เล็กเป็นแอ่งและมักมีตุ่มเล็ก ๆ ด้านล่าง ขอบเส้นใบมีตุ่มใบคล้ายเป็นถุง เส้นใบเป็นวงและ เชื่อมกันใกล้ขอบใบในครึ่งบนเส้นใบย่อยเป็น ร่องแหว่งเปิด มักจาง ดอก ยาว 5 เซนติเมตร สีขาว สมมาตร แยกเพศ ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่บนต้นเดียวกัน ออกเป็นช่อคล้ายช่อเชิงลด แตกแขนงหรือมดหุ้ม ยาวได้ถึง 18 เซนติเมตร มักออกที่ง่ามใบ (พบน้อยออกตามกิ่งใต้รอยแผล ใบหรือใกล้ปลายกิ่ง) กลีบเลี้ยงแยกกันมี 5 กลีบ ยาว 1-3 มิลลิเมตร กลีบ ใน 2 กลีบใหญ่กว่า กลีบนอก 3 กลีบ สีเขียวอ่อน คล้ายกลีบดอก ช่อกันที่โคนกลีบดอกแยกกันมี 5 กลีบ กว้าง ได้ถึง 2 มิลลิเมตร ยาวได้ถึง 4 มิลลิเมตร ใหญ่กว่ากลีบ เลี้ยง รูปรีถึงรูปไข่กลับ โคนแคบยาวได้ถึง 1 มิลลิเมตร ด้านในมีรยางค์ ปลายกว้างและมีขน แบบขนแกะ 2 อัน เกสรตัวผู้ 8 อันยาวได้ถึง 6 มิลลิเมตร ล้อมรอบด้วยจานฐานดอกเป็นวงแหวนหรือรูปเกือกม้า รั้งไข่เป็น 3 มุม มีขน ผล กว้าง 0.7-1.8 เซนติเมตร ยาว (7-1.5 ๆ) อมเทา แก่สีแดงอมส้ม รูปหัวใจ จักเป็น พูได้ถึง 3 พู แต่ละพูขนาด 0.5-1 เซนติเมตร โคนแคบ ยาว 2-5 มิลลิเมตร คล้ายหนังบาง แก่แตกตามพู เมล็ดขนาด 5-9 มิลลิเมตร มี 1 เมล็ดต่อ 1 พูมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีเหลืองหรือส้มหุ้มมิด เมล็ดเมื่อเอาเยื่อหุ้มออกสีน้ำตาลหรือดำและเรียบ พบกระจายในชั้นเรือนยอดรองในป่ารุ่นหรือพบน้อยในป่าที่ยังไม่ถูกทำลาย มักขึ้นบนสันทรายหรือดินไม่ดี จ.พังงา สตูล สงขลา



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : <http://crassa.cocolog-nifty.com/blog/2015/09/guioa-diplopeta.html>

