

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น

ใหญ่ ผลัดใบ สูงถึง 50 ม. เรือนยอดแผ่กว้าง ไม่เป็นระเบียบ พุ่มใหญ่ สูงถึง 5 ม. เห็นชัดเมื่อโตเต็มที่ เปลือก สีเทาเงินหรือออกชมพู บางเรียบและเป็นเงา เป็นวงและปุ่มกลมใหญ่เมื่ออ่อน จะเริ่มหดย่นเมื่อแก่ เปลือกในสีน้ำตาลอม เหลืองอ่อนถึงสีส้มหม่น หนาและอ่อน มีเส้นใยละเอียด ไม่มีน้ำยางหรือน้ำเลี้ยว ใบ เดี่ยว ออกสลับ ออกดกใกล้ปลายกิ่ง รูปไข่กว้างถึงเกือบกลม หรือขอบขนานแกมรี กว้าง 9-15 ซม. ยาว 10-20 ซม. ปลายทุ่หรือแหลมสั้น โคนกลม หรือรูปหัวใจ จักเล็ก 3-5 แฉก ขอบจักซี่ฟันที่ไม่เป็นระเบียบ ใบอ่อนมีขนคล้ายเส้นไหม ใบแก่สีเขียวเข้มอ่อน เนื้อบาง มีขนละเอียดโดยเฉพาะบนเส้นใบด้านล่าง เส้นใบ 5(7) เส้นจากโคน หนุนชัดด้านบน เส้นใบย่อยเป็นชั้นบันได เห็นชัดด้านล่าง ก้านใบเล็กยาว 6-12 ซม. มีข้อต่อชัดที่โคน มีขน มีต่อมคล้ายปุ่ม 8-12 ต่อม ไม่มีหูใบ กิ่งแข็งใหญ่ มีรอยแผลใบชัด ดอก สีอมเขียว ดอกแยกเพศ ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่คนละต้น เป็นช่อแน่น ยาว 10-25 ซม. ดอกแน่นใกล้ปลาย กิ่งที่ไม่มีใบ ดอกเพศผู้แตกแขนง แต่ไม่แตกแขนงในดอกเพศเมีย ก้านดอกยาวได้ถึง 1 มม. ไม่มีกลีบดอก ดอกเพศผู้ยาว ประมาณ 2.5 มม. กลีบเลี้ยงรูปถ้วย จักเล็ก 4 แฉก บางที่ระหว่างแฉกมีซี่ฟันด้วย เกสรเพศผู้มี 4 อัน ติดบนขอบถ้วยกลีบเลี้ยงตรงข้ามแฉก ล้อมรอบจานฐานดอกที่ฝังอยู่ ดอกเพศเมียยาวประมาณ 4 มม. กลีบเลี้ยงรูปประฆังหรือลูกช้าง มีแฉก สั้นเป็นซี่รูปสามเหลี่ยม 4(5) ซี่ รั้งไขได้วางกลีบมี 1 ช่อง ก้านเกสรเพศเมียมี 4(5) อัน ติดบนขอบถ้วยกลีบเลี้ยงตรงข้ามแฉก ผล กลมหรือรูปคนโท ยาว 0.5 ซม. สีน้ำตาลอ่อน เป็นสันแคบ 8-10 สัน มีก้านเกสรเพศเมียยาวถึง 2 มม. เปลือก นอกบาง แตกเป็นรูระหว่างก้านเกสรเพศเมีย เมล็ดเล็กจำนวนมากยาวประมาณ 1 มม. ไม้เด่นในป่าดิบที่ต่ำ พบตามลำธารในป่าผลัดใบ ที่ขึ้นตามโคนเขาหินปูน ช่วงออกดอกและติดผล จะไม่มีใบ



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : <http://www.fca16mr.com/webblog/blog.php?id=1113>

