

สมเ็็ด

Pometia ridleyi King ex Rodlk.

วงศ์ SAPINDACEAE

ไม้พุ่ม ถึงไม้ต้นขนาดเล็ก อาจสูงได้ถึง 10 ม. ก้านใบยาว 3-5 มม. ใบเดี่ยว รูปรีหรือรูปใบหอก แกมรูปไข่ หรือรูปไข่เบี้ยว ขนาด 3-7 x 6-14 ซม. เนื้อใบคล้ายแผ่นกระดาษบางครั้งคล้ายแผ่นหนัง ท้องใบสีเขียวอมเทา มีขนละเอียดปกคลุม บางครั้งเกลี้ยง หลังใบสีเขียว ฐานใบมีทั้งแหลม มน หรือกลม ปลายใบ เรียวแหลมสั้นๆ บางครั้งมน ดอกออกเป็นกลุ่มตามง่ามใบ ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น อาจอยู่ ช่อเดียวกันหรือแยกช่อกัน ดอกตัวผู้ มีก้านดอกยาว 5 มม. มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบรูปรี ยาวประมาณ 2 มม. เกสรเพศผู้ 3 อัน ดอกตัวเมียมีก้านดอกยาว 2-3 มม. หรือเกือบไม่มี กลีบเลี้ยงมี 6 กลีบ รูปไข่ มี 2 วง วงใน 0.5-1.1x0.9-1.8 มม. วงนอกขนาด 0.6-1.2x0.9-2.3 มม. ผลแบบแคปซูล ทรงกลมมีร่องกตตามยาว ทำให้มีลักษณะเป็นพู 6 พู ขนาด 5-6 x 10-18 มม. สีแดงเรื่อ มีขนละเอียดปกคลุม



พบในป่าที่ถูกรบกวน หรือพื้นที่เปิดโล่ง ตั้งแต่ระดับความสูง 700-1000 ม. จากตอนล่างของจีนจนถึงปาปัวนิวกินี

อ้างอิงข้อมูล : <http://portal.cybertaxonomy.org/flora-malesiana/node/6648>

ภาพประกอบ : Npic-Surat



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Parks Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)