

สนกระ


วงศ์ RUBIACEAE

Prismatomeris tetrandra (Rox.b.) K.Schum. var. *malayana* (Ridl.) Johans.

ชื่ออื่น : กระตุกไก่อ่ กรัก กรักผี ซ้อนป่า ตุ๊กไก่อ่ขาว ตุ๊กไก่อ่ดำ ต่อกกระตุก ผ่าโฮ่ม พุดป่า

ไม้ต้น

ทรงพุ่มขนาดเล็ก มีเปลือกลำต้นเรียบเป็นสีน้ำตาลอมเทา แตกกิ่งก้านสาขาค่อนข้างน้อย มีความสูงของลำต้นประมาณ 5 ม.



ใบ : มีลักษณะเป็นรูปรีหรือรูปขอบขนาน แผ่นใบมีสีเขียว เรียบ หนา โคนใบและปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ เส้นกลางใบทั้งด้านบนและด้านล่างนูน มีขนาดความกว้างของใบประมาณ 1-8 ซม. ยาวประมาณ 2.5-20 ซม. มีหูใบรูปสามเหลี่ยมอยู่ระหว่างก้านใบ มักออกเป็นใบเดี่ยวๆ สลับตั้งฉากตรงข้ามกัน





ดอก : ออกเป็นช่อกระจุกบริเวณซอกใบและปลายยอด ในแต่ละช่อจะมีดอกย่อยอยู่ประมาณ 4-10 ดอก มีกลีบดอกสีขาวที่โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ส่วนปลายกลีบแยกออกจากกันเป็น 5 แฉก มีกลีบเลี้ยงรูปถ้วยที่โคนเชื่อมติดกัน มีเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียยื่นออกมาเหนือหลอดดอก ดอกจะบานพร้อมกันทั้งช่อ ดอกที่บานเต็มที่จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2.5-3 ซม. ให้กลิ่นหอมอ่อนๆ ตลอดทั้งวัน ดอกบานทนอยู่ได้นานประมาณ 2 สัปดาห์ แล้วจึงร่วงโรยไป



ผล : มีลักษณะเป็นรูปทรงกลมหรือแป้น ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อสุกจะกลายเป็นสีดำ

สรรพคุณของสนกระะ

ราก-มีรสขมเย็น ใช้เป็นยาแก้พิษโลหิต แก้ดีพิการ
ทั้งต้น-ใช้เป็นยาแก้กระษัยไตพิการ ช่วยขับปัสสาวะ

อ้างอิงข้อมูล : <http://www.vichakaset.com/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0/>

ภาพประกอบ : Flickr by (Ahmad Fuad Morad, Cerlin Ng)



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Parks Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)