

ไม้ต้น สูงถึง 30 ม. เรือนยอดรูปกรวยแคบเมื่อต้นยังอ่อน และเริ่มมีเรือนยอดระเกะระกะ สูงชันกิ่งข้างห้อย เปลือก สีน้ำตาลแดงถึงน้ำตาลเทา แตกสะเก็ดหรือเป็นแผ่น เปลือกในสีแดงเข้ม ใบลดรูปลงเป็นเกล็ดเล็กๆ ออกเป็นวงรอบข้อ บนกิ่งสีเขียว ยาว 8-20 ซม. หนา 0.5-1 ซม. ระยะห่างกันประมาณ 1 ซม. ข้อละ 7-8 (พบน้อย 6 หรือ 9) เกล็ดกิ่งกลมเรียบไม่แตกแขนง อาจมองคล้ายใบสนเขา สีใบจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและหลุดออกเป็นพ่อน ดอก เล็ก แยกเพศ ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่ต่างข้อ ดอกเพศผู้เป็นช่อเชิงลด ยาว 1-3 ซม. ออกที่ปลายกิ่งสีเขียว มีเกสรเพศผู้ 1 อันตามซอก ใบประดับมีขน ปลายยอดเป็นรูปหัวนม ดอกเพศเมียออกเป็นช่อกระจุกกลม กว้าง 0.5 ซม. บนกิ่งแข็งติดแน่น แต่ละดอกมีก้านเกสรเพศเมีย ยาว 3-5 มม. สีแดง ปลายแตกเป็นส้อมแผ่ยาวขึ้นมาเหนือใบประดับ ผล รูปไข่ แข็งคล้ายโคนสน กว้าง 1.2-1.5 ซม. ยาว 1.5-2 ซม. ก้านยาว 0.5-1.2 ซม. ประกอบด้วยตุ่มประมาณ 30 ตุ่ม เมื่อแก่จะเปิดออกปล่อยเมล็ดมีปีกออก มาขนาด 6 มม. พบทั่วไปเป็นพืชเบิกนำตามป่าชายหาด



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : <http://tropical.theferns.info/image.php?id=Casuarina+equisetifolia>