

สุเทรียน

Toona sureni (Blume) Merr.
วงศ์ MELIACEAE

ไม้ต้น เปลือกในกลิ่นหอม



ใบ : ใบย่อย 6-10(12) คู่ขอบใบเรียบขนสั้น มีต่อมรูปถ้วยบนเส้นกลางใบด้านบน มีขนกระจายถึงแน่นโดยเฉพาะบนเส้นใบด้านล่าง



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Parks Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

ดอก : มีกลิ่นเหม็น เป็นช่อยาว 20-60 ซม. กลีบดอกมีแถบขนตรงกลางกลีบด้านนอก ในตาดอก รังไข่ไม่เหมือนกัน มีจานฐานดอกเล็กก้านเกสรเพศเมีย มีขน



ผล : เป็นตุ่ม มีช่องอากาศชัด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5-2 มม. แกนกลางผลมี 5 มุม และเมล็ดจำนวนมาก ยาว 1.-2 ซม. รวมปีกบางทั้งสองด้าน ติดที่ปลายแกน



นิเวศวิทยา : พบในป่าที่ต่ำ
บางที่ปลูก

อ้างอิงข้อมูล : ไชมอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร และก่องกานดา ชยามฤต. ไม้ป่าภาคใต้เล่ม 2. ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ ; 2559 (หน้า 1258)

ภาพประกอบ : www.plantsofasia.com , www.pngplants.org