

สักเขา(พันจำ)

Vatica harmandiana Pierre

DIPTEROCARPACEAE

ชื่ออื่น : ขี้มอด ชัน ซี ชีตง ต่าง ตำเสา เต็งตง พันจำ ยางหนู รือเสาะ สัก สักเขา

ไม้ต้น สูงได้ถึง 25 ม. เปลือกสีน้ำตาลเทา กิ่งมีขนรูปดาวสั้นนุ่มสีน้ำตาลแดงหรือเกือบเกลี้ยง ทุใบรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 4 มม. ใบรูปรี รูปขอบขนาน หรือแกมรูปไข่หรือรูปไข่กลับ ยาว 5.5-12 ซม. มีเส้นแขนงใบแฉก ก้านใบยาว 0.7-2 ซม. ช่อดอกยาว 2-8 ซม. ช่อแขนงย่อยมี 2-5 ดอก ตาดอกรูปใบหอก ยาว 0.7-1 ซม. กลีบเลี้ยงรูปไข่ ยาวประมาณ 4 มม. ด้านนอกมีขนสั้นนุ่ม ดอกสีขาวมีปื้นชมพู กลีบรูปใบหอกกลับ ปลายมน ยาว 0.9-1.2 ซม. เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 1.5 มม. แขนงอับเรณูเป็นติ่ง ยาวเท่า ๆ อับเรณู รังไข่มีขนสั้นนุ่ม ก้านเกสรเพศเมียยาวเท่า ๆ รังไข่ ผลเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 มม. ปลายเป็นติ่งแหลม ก้านยาว 2-3 มม. ปีกยาว 2 ปีก ส่วนมากยาว 4-6 ซม. ปีกสั้น 3 ปีก ยาว 0.7-2 ซม.

พบที่พม่า ภูมิภาคอินโดจีน คาบสมุทรมลายู และบอร์เนียว ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 600 เมตร



ข้อมูลอ้างอิง : <http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordsLinkno=0&words=%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%B3&typeword=word>

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

